

## Пиперазин



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Пиперазина адипинат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндекс](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противогельминтное средство. Оказывает парализующее действие на нематоды, нарушая функцию их нервно-мышечной системы.

### **Показания к применению:**

Аскаридоз, энтеробиоз.

### **Относится к болезням:**

- [Энтерит](#)
- [Энтеробиоз](#)

### **Противопоказания:**

Органические заболевания ЦНС, повышенная чувствительность к пиперазина адипату.

## Способ применения и дозы:

При аскаридозе принимают в течение 2 дней подряд по 2 раза/сут за 1 ч до или через 0.5-1 ч после еды в следующих дозах:

Возраст пациента	Разовая доза
<b>Взрослые</b>	1.5-2 г
<b>Дети:</b>	
13-15 лет	1.5 г
9-12 лет	1 г
6-8 лет	750 мг
4-5 лет	500 мг
2-3 года	300 мг
до 1 года	200 мг

Возможно также применение в течение одного дня: однократно от 400 мг до 4 г (в зависимости от возраста) или 2 раза от 200 мг до 2 г. При энтеробиозе применяют в тех же дозах в течение 5 дней подряд, проводят 1-3 цикла лечения с 7-дневным перерывом. В перерывах между циклами рекомендуется назначать на ночь клизму (для удаления остриц из прямой кишки): взрослым - из 4-5 стаканов воды, детям - из 1-3 стаканов воды (с добавлением натрия гидрокарбоната по 1/2 чайной ложки на стакан воды).

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, боли в животе.

*Со стороны ЦНС:* преходящая головная боль. У больных с почечной недостаточностью препарат может вызывать нейротоксические осложнения. При передозировке возможны тремор и мышечная слабость.

## Особые указания и меры предосторожности:

Применение пиперазина адипата не требует предварительной подготовки больных и назначения специальной диеты. Слабительные средства назначают лишь при склонности к запорам (в дни приема пиперазина вечером). При лечении энтеробиоза необходимо строгое соблюдение гигиенического режима.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Piperazin>