

## Пирацезин



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капсулы** твердые желатиновые, размер №0, белого цвета, цилиндрические с полусферическими концами; содержимое капсул - порошок белого или почти белого цвета.

	<b>1 капс.</b>
пирацетам	400 мг
циннаризин	25 мг

*Вспомогательные вещества:* магнезия карбонат основной, кальция стеарат.

*Состав оболочки:* желатин, глицерол, нипагин, нипазол, натрия лаурилсульфат, вода очищенная, титана диоксид.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат с выраженным антигипоксическим, ноотропным и сосудорасширяющим действием.

Пирацетам активизирует метаболические процессы в головном мозге посредством усиления энергетического и белкового обмена, ускорения утилизации глюкозы клетками и повышения их устойчивости к гипоксии. Улучшает межнейрональную передачу в ЦНС и регионарный кровоток в ишемизированной зоне.

Циннаризин - блокатор кальциевых каналов, ингибирует поступление в клетки ионов кальция и уменьшает их содержание в депо плазмолеммы, снижает тонус гладкой мускулатуры артериол, уменьшает их реакцию на биогенные сосудосуживающие вещества (эпинефрин, норэпинефрин, допамин, ангиотензин, вазопрессин). Обладает сосудорасширяющим эффектом (особенно в отношении сосудов головного мозга, усиливая антигипоксическое действие пирацетама), не оказывая существенного влияния на АД. Проявляет умеренную антигистаминную активность, уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата, повышает тонус симпатической нервной системы. Повышает эластичность мембран эритроцитов, их способность к деформации, снижает вязкость крови.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Пирацезин не предоставлены.

### Показания к применению:

— нарушения мозгового кровообращения (ишемический инсульт, восстановительный период после геморрагического

## Пирацезин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

инсульта);

- энцефалопатии различного генеза;
- интоксикации;
- травмы головного мозга;
- заболевания ЦНС, сопровождающиеся снижением интеллектуально-мнестических функций;
- психоорганический синдром с преобладанием симптомов астении и адинамии;
- астенический синдром;
- лабиринтопатии;
- синдром Меньера;
- профилактика кинетозов;
- отставание интеллектуального развития у детей;
- профилактика мигрени.

### Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Геморрой](#)
- [Инсульт](#)
- [Интоксикация](#)
- [Мигрень](#)
- [Нарушение мозгового кровообращения](#)
- [Психоорганический синдром](#)
- [Травмы](#)
- [Энцефалит](#)

### Противопоказания:

- печеночная недостаточность;
- почечная недостаточность;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- детский возраст до 5 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

**Взрослым** препарат назначают по 1-2 капс. 3 раза/сут в течение 1-3 мес в зависимости от тяжести заболевания. Курс лечения - 2-3 раза в год.

**Детям старше 5 лет** назначают по 1-2 капс. 1-2 раза/сут.

### Побочное действие:

*Возможно:* раздражительность, нарушения сна, тошнота, явления диспепсии.

### Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Пирацезин не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Пирацезин противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении с Пирацезином возможно усиление эффектов ноотропных, адаптогенных, гипотензивных препаратов, а также средств, угнетающих деятельность ЦНС (в т.ч. этанола).

Пирацезин улучшает переносимость антипсихотических лекарственных средств и трициклических антидепрессантов.

При совместном применении Пирацезин ослабляет эффект гипертензивных средств.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***При нарушениях функции почек***

Препарат противопоказан при почечной недостаточности.

### ***При нарушениях функции печени***

Препарат противопоказан при печеночной недостаточности.

### ***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан детям до 5 лет.

**Детям старше 5 лет** назначают по 1-2 капс. 1-2 раза/сут.

## **Условия хранения:**

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Piracezin>