


## Пирантел



### **Код АТХ:**

- [P02CC01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Пирантел](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Таблетки** желтого цвета, овальные, двояковыпуклые, с риской на одной стороне.

	<b>1 таб.</b>
пирантела памоат	720 мг,
что соответствует содержанию пирантела	250 мг

*Вспомогательные вещества:* желатин - 5 мг, крахмал кукурузный - 59 мг, магния стеарат - 10 мг, натрия карбоксиметилкрахмал - 6 мг, тальк очищенный - 10 мг.

3 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

3 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Пирантела памоат противоглистный препарат широкого спектра действия. Механизм действия связан с блокированием нервно-мышечной проводимости у гельминтов. Активен в отношении *Enterobius vermicularis*, *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostoma doudenale*, *Necator Ameri-canus*, *Trichostrongylus oricntalis*, *Trichostrongylus colubriformis*. Действует как на половозрелых, так и на неполовозрелых особей обоего пола, не действует на личинки в стадии миграции.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь пирантел плохо абсорбируется из ЖКТ. После приема разовой дозы 10 мг/кг массы тела концентрация пирантела в плазме составляет 0.005-0.13 мкг/мл в течение 1-3 ч. Пирантел, абсорбировавшийся в системный кровоток, частично метаболизируется в печени до N-метил-1,3-пропанедиамина. 50% от принятой дозы

выводится в неизменном виде с калом, около 7% - с мочой в неизменном виде или в виде метаболита.

### Показания к применению:

— аскаридоз, анкилостомидоз, некатороз и энтеробиоз.

### Относится к болезням:

- [Аскаридоз](#)
- [Энтерит](#)
- [Энтеробиоз](#)

### Противопоказания:

- миастения (период лечения);
- детский возраст до 3-х лет (твердая лекарственная форма);
- повышенная чувствительность к пирантелу и другим компонентам препарата.

*С осторожностью:* печеночная недостаточность.

### Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь во время или после еды и дозировку устанавливают индивидуально в зависимости от возраста и массы тела пациента.

*Аскаридоз и энтеробиоз, а также смешанные инвазии* - однократно в дозе 10 мг/кг массы тела.

**Дети от 3 до 6 лет:** 250 мг (1 таб.); *дети 6 лет - 12 лет:* 500 мг (2 таб.); **дети старше 12 лет и взрослые с массой тела < 75 кг:** 750 мг (3 таб.); **взрослые с массой тела > 75 кг:** 1000 мг (4 таб.).

Таблетку следует тщательно разжевывать.

*Анкилостомидоз:* препарат назначают из расчета - 10 мг/кг массы тела в сутки в течение 3 дней.

*Некатороз:* при тяжелых формах препарат назначают в дозе из расчета 20 мг/кг массы тела в сутки в течение 2 дней.

### Побочное действие:

*Со стороны ЖКТ и печени:* снижение аппетита, возможны тошнота, рвота, диарея, боли в желудке; редко - повышение активности печеночных трансаминаз.

*Со стороны ЦНС:* редко - головная боль, головокружение, сонливость, бессонница, слабость; в отдельных случаях - нарушение слуха, галлюцинации, спутанность сознания, парестезии.

*Прочие:* кожная сыпь, крапивница, повышение температуры тела.

### Передозировка:

*Лечение:* промывание желудка. Специфического антидота нет.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода.

При применении в период лактации рекомендуется прекратить грудное вскармливание.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не следует назначать одновременно с пиперазином (ослабление действия).

При одновременном применении пирантел повышает концентрацию теофиллина в плазме.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

После приема пирантела слабительное не назначают. При энтеробиозе следует провести одновременное лечение всех совместно проживающих лиц. После завершения лечения необходимо провести контрольное исследование кала на наличие яиц паразитов. Необходимо тщательное соблюдение гигиены (уборка жилых помещений и чистка одежды для уничтожения яиц гельминтов служит профилактикой реинфекции).

### ***При нарушениях функции печени***

*С осторожностью:* печеночная недостаточность.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 3-х лет (твердая лекарственная форма). Возможно применение у детей старше 3-х лет.

## **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат с истекшим сроком годности.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Pirantel>