

Пиразидол



Код АТХ:

- [N06AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пирлиндол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки	1 таб.
пирлиндола гидрохлорид	25 мг
"-	50 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, кальция стеарат.

50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антидепрессант. Сочетает тимолептический эффект со сбалансированным действием на ЦНС, при этом активирующее влияние на больных с апатическими, анергическими депрессиями сочетается с седативным действием у пациентов в ажитированном состоянии.

Пиразидол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Избирательно, кратковременно и обратимо ингибирует MAO типа А; в высокой степени блокирует дезаминирование серотонина и норадреналина, в меньшей степени – тирамина. Частично ингибирует обратный захват моноаминов. Активирует процессы синаптической передачи нервного возбуждения в ЦНС.

Ослабляет депрессивные эффекты резерпина, потенцирует эффекты предшественника норэпинефрина – диоксифенилаланина (L-допы), стимулирует адренергические структуры; потенцирует эффекты предшественника серотонина 5-окситриптофана (стимулирует серотонинергические структуры).

Не обладает антихолинергическим действием. Оказывает ноотропное действие, улучшает когнитивные функции.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Пиразидол не предоставлены.

Показания к применению:

- депрессии различного генеза, преимущественно с психомоторной заторможенностью и астеническими расстройствами, тревожно-депрессивными или тревожно-бредовыми компонентами;
- сенильная, инволюционная депрессия;
- алкогольный абстинентный синдром;
- болезнь Альцгеймера (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Абстинентный синдром](#)
- [Астения](#)
- [Депрессия](#)

Противопоказания:

- острый гепатит;
- заболевания крови;
- одновременный прием ингибиторов MAO и период до 14 дней после их отмены;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают в начальной дозе 50-75 мг/сут, разделенной на 2 приема. Затем дозу постепенно увеличивают на 25-50 мг до 150-300 мг/сут. Максимальная суточная доза – 400 мг. Кратность приема – 2-3 раза/сут.

После достижения терапевтического эффекта препарат продолжают применять в индивидуально подобранной дозе в течение 2-4 недель. Затем дозу постепенно уменьшают.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота.

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: тремор, головокружение.

Прочие: потливость, тахикардия, аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Пиразидол не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых исследований по безопасности и эффективности применения препарата при беременности и в период лактации не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении повышает эффективность эpineфрина (в связи с антимонаминоксидазной активностью).

Особые указания и меры предосторожности:

Пиразидол не назначают одновременно с антидепрессантами-ингибиторами MAO, фуразолидоном, прокарбазином, селегилином.

Возможно применение Пиразидола у пациентов с глаукомой и доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Пиразидол совместим с антипсихотическими средствами, анксиолитиками.

При нарушениях функции печени

Препарат противопоказан при остром гепатите.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pirazidol>