Пиридоксальфосфат



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
пиридоксальфосфат	10 мг
-"-	20 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат.

Состав оболочки: гипромеллоза, хинолиновый желтый, титана диоксид, тальк, полиэтиленгликоль 6000.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.
50 шт. - банки стеклянные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, влияющий на метаболизм. Является коферментной формой витамина B_6 (пиридоксина) и обладает свойствами витамина B_6. Осуществляет декарбоксилирование и переаминирование аминокислот. Снижает концентрацию холестерина и липидов, увеличивает количество гликогена в печени, улучшает дезинтоксикационные свойства печени, участвует в обмене гистамина. Стимулирует обменные процессы в коже и слизистых оболочках.

Преимущество пиридоксальфосфата перед другими препаратами витамина B_6 состоит в том, что его терапевтическое действие развивается быстро и он может применяться при состояниях, резистентных к действию пиридоксина, когда нарушено фосфорилирование последнего.

Фармакокинетика

Пиридоксальфосфат быстро всасывается из ЖКТ. Проникает через плацентарный барьер и выделяется с грудным молоком.

Выводится с мочой.

Показания к применению:

— профилактика и лечение гиповитаминоза B_6, в т.ч. у детей старше 5 лет, включая следующие заболевания и состояния: гипохромная и микроцитарная анемия, лейкопения, паркинсонизм, хорея, гепатит, дерматит (в т.ч. атопический), диффузный нейродермит, экссудативный диатез, псориаз;

— в составе комплексной терапии цереброваскулярной недостаточности, поражений периферической нервной системы (радикулиты, невриты, невралгии), хронической сердечной недостаточности, хронического гепатита, цирроза печени, токсикоза первой половины беременности (легкой и средней степени);

— для профилактики поражений печени, развития невритов и других осложнений на фоне применения противотуберкулезных препаратов.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Дерматит
- Диатез
- Лейкоз
- Невралгия
- Неврит
- Нейродермит
- Паркинсонизм
- Псориаз
- Радикулит
- Сердечная недостаточность
- Токсикоз
- Хорея
- Цереброваскулярная недостаточность

Противопоказания:

— печеночная недостаточность;

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь через 10-15 мин после еды.

Взрослым назначают в дозе 20-40 мг 3-5 раз/сут, суточная доза для взрослых составляет 40-160 мг.

Детям назначают в дозе 10-20 мг 3-5 раз/сут, суточная доза для детей составляет 20-60 мг.

Длительность курса лечения составляет от 10 до 30 дней и более в зависимости от характера заболевания и эффективности терапии.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь.

Со стороны пищеварительной системы: понижение pH желудочного сока.

Передозировка:

Данных о случаях передозировки препарата Пиридоксальфосфат в настоящее время нет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности по показаниям в рекомендуемых дозах.

Данных о возможности и безопасности применения препарата в период лактации нет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Циклосерин, пеницилламин при одновременном применении снижают эффект Пиридоксальфосфата.

Пиридоксальфосфат при одновременном применении ослабляет противопаркинсоническую активность леводопы.

Пиридоксальфосфат фармацевтически несовместим с витаминами B_1 и B_{12}.

Особые указания и меры предосторожности:

С *осторожностью* следует применять препарат при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в связи с возможным понижением pH желудочного сока), а также при ИБС.

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение препарата при печеночной недостаточности

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Piridoksalfosfat