

## [Пиридоксальфосфат](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe Горздрав Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки, покрытые оболочкой** желтого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	<b>1 таб.</b>
пиридоксальфосфат	10 мг
"	20 мг

*Вспомогательные вещества:* лактоза, крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат.

*Состав оболочки:* гипромеллоза, хинолиновый желтый, титана диоксид, тальк, полиэтиленгликоль 6000.

- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.
- 50 шт. - банки стеклянные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат, влияющий на метаболизм. Является коферментной формой витамина В<sub>6</sub> (пиридоксина) и обладает свойствами витамина В<sub>6</sub>. Осуществляет декарбоксилирование и переаминирование аминокислот. Снижает концентрацию холестерина и липидов, увеличивает количество гликогена в печени, улучшает дезинтоксикационные свойства печени, участвует в обмене гистамина. Стимулирует обменные процессы в коже и слизистых оболочках.

Преимущество пиридоксальфосфата перед другими препаратами витамина В<sub>6</sub> состоит в том, что его терапевтическое действие развивается быстро и он может применяться при состояниях, резистентных к действию пиридоксина, когда нарушено фосфорилирование последнего.

#### Фармакокинетика

Пиридоксальфосфат быстро всасывается из ЖКТ. Проникает через плацентарный барьер и выделяется с грудным молоком.

Выводится с мочой.

### Показания к применению:

— профилактика и лечение гиповитаминоза В<sub>6</sub>, в т.ч. у детей старше 5 лет, включая следующие заболевания и состояния: гипохромная и микроцитарная анемия, лейкопения, паркинсонизм, хорея, гепатит, дерматит (в т.ч. атопический), диффузный нейродермит, экссудативный диатез, псориаз;

— в составе комплексной терапии цереброваскулярной недостаточности, поражений периферической нервной системы (радикулиты, невриты, невралгии), хронической сердечной недостаточности, хронического гепатита, цирроза печени, токсикоза первой половины беременности (легкой и средней степени);

— для профилактики поражений печени, развития невритов и других осложнений на фоне применения противотуберкулезных препаратов.

### Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Диатез](#)
- [Лейкоз](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Нейродермит](#)
- [Паркинсонизм](#)
- [Псориаз](#)
- [Радикулит](#)
- [Сердечная недостаточность](#)
- [Токсикоз](#)
- [Хорея](#)
- [Цереброваскулярная недостаточность](#)

### Противопоказания:

— печеночная недостаточность;

— повышенная чувствительность к препарату.

### Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь через 10-15 мин после еды.

**Взрослым** назначают в дозе 20-40 мг 3-5 раз/сут, суточная доза для взрослых составляет 40-160 мг.

**Детям** назначают в дозе 10-20 мг 3-5 раз/сут, суточная доза для детей составляет 20-60 мг.

Длительность курса лечения составляет от 10 до 30 дней и более в зависимости от характера заболевания и эффективности терапии.

### Побочное действие:

*Аллергические реакции:* кожная сыпь.

*Со стороны пищеварительной системы:* понижение pH желудочного сока.

### Передозировка:

Данных о случаях передозировки препарата Пиридоксальфосфат в настоящее время нет.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности по показаниям в рекомендуемых дозах.

## **Пиридоксальфосфат**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Данных о возможности и безопасности применения препарата в период лактации нет.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Циклосерин, пеницилламин при одновременном применении снижают эффект Пиридоксальфосфата.

Пиридоксальфосфат при одновременном применении ослабляет противопаркинсоническую активность леводопы.

Пиридоксальфосфат фармацевтически несовместим с витаминами B<sub>1</sub> и B<sub>12</sub>.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

С *осторожностью* следует применять препарат при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в связи с возможным понижением pH желудочного сока), а также при ИБС.

#### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказано применение препарата при печеночной недостаточности

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Piridoksalfosfat>