

[Пирогенал \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммунотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуномодулятор широкого спектра действия, активирует ретикулоэндотелиальную, гипоталамо-гипофизарную и фибринолитическую системы. Обладает десенсибилизирующим и противовоспалительным свойствами, повышает общую и специфическую резистентность организма, влияет на терморегулирующие центры гипоталамуса.

Показания к применению:

- травмы ЦНС и периферической нервной системы;
- туберкулез (торпидная форма в фазе рассасывания);
- хронические заболевания печени;
- стриктуры уретры, мочеточников, хронический простатит, уретрит;
- увеит, иридоциклит, герпетическая инфекция глаза, помутнение роговицы;
- воспаление придатков матки, бесплодие;
- спаечная болезнь брюшной полости;
- ожоговая болезнь;
- венерические заболевания;
- псориаз и др. хронические заболевания кожи.

Для пиротерапии.

Относится к болезням:

- [Бесплодие](#)
- [Воспаление](#)
- [Герпес](#)
- [Инфекции](#)
- [Иридоциклит](#)
- [Псориаз](#)
- [Травмы](#)
- [Туберкулез](#)
- [Увеит](#)
- [Уретрит](#)

Противопоказания:

— острые лихорадочные заболевания;

— хронические заболевания в стадии обострения и декомпенсации (за исключением заболеваний, являющихся показанием к назначению препарата);

— заболевания крови;

— беременность.

С осторожностью: заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, сахарный диабет, снижение судорожного порога, судороги, фебрильные судороги.

Способ применения и дозы:

В/м 1 раз/сут через день, при необходимости препарат разводят 0.9% раствором натрия хлорида.

Начальная разовая доза – 0.2 мкг, в последующие дни дозу постепенно увеличивают на 2.5-5 мкг.

Максимальная разовая доза – 100 мкг. Полный курс – 10-30 инъекций, при необходимости возможно повторение курса – через 2-3 мес.

Для пиротерапии – в/м 1 раз/сут, начиная с 5-10 мкг с повышенным повышением дозы до 100-150 мкг. Инъекции проводят через 1-2 дня.

Ректально, 1 суппозиторий в сутки ежедневно или через день, начальная доза – 50 мкг, максимальная доза – 200 мкг. Курс лечения – 12-15 суппозиторияев. Рекомендовано лечение по схеме: 50, 50, 50, 100, 100, 100, 150, 150, 150, 200, 200, 200 мкг. При применении суппозиторияев в виде монотерапии для иммунореабилитации при неполном выздоровлении после перенесенного острого бактериального или вирусного заболевания следует использовать суппозитории 50 или 100 мкг. Курс лечения – 5-10 суппозиторияев.

Возможно одновременное лечение суппозиториями и в/м инъекциями.

Побочное действие:

Повышение температуры тела до 37.5°C), озноб, недомогание; редко – гипертермия (до 39.5°C), сильный озноб, головная боль, боль в пояснице.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Если при в/м введении обычно в течение 3-8 ч возникают гипертермия, озноб, недомогание, то дозировку, вызвавшую подобную реакцию повторяют в последующие дни (обычно 1-3 сут) до прекращения реакции, после чего дозу последовательно повышают.

Пирогенал (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Если в течение 6-8 ч возникают гипертермия до 39.5°C, сильный озноб, головная боль, боль в пояснице, то дозу препарата рекомендуется снизить. При использовании препарата для пиротерапии вышеописанные реакции допустимы.

При наличии судорожной готовности препарат назначают на фоне противосудорожной терапии.

При нарушениях функции почек

С осторожностью: заболевания почек.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pirogenal_svechi