Плазма-Лит 148 Водный Раствор



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Калия хлорид
- Магния хлорид
- Натрия ацетат
- Натрия глюконат
- Натрия хлорид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для инфузий	**1 л**
калия хлорид	370 мг
магния хлорид	300 мг
натрия ацетат	3.68 г
натрия глюконат	5.02 г
натрия хлорид	5.26 г
что соответствует содержанию Na^+	140 ммоль
K^+	5 ммоль
Mg^{2+}	1.5 ммоль
Cl^-	98 ммоль
CH_3COO^-	27 ммоль
глюконат-ион	23 ммоль

500 мл - контейнеры пластиковые "Виафлекс" (1) - мешки пластиковые (20) - коробки картонные.
1000 мл - контейнеры пластиковые "Виафлекс" (1) - мешки пластиковые (10) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Плазма-Лит 148 водный раствор корригирует кислотно-основное состояние, восполняет дефицит жидкости и электролитов, усиливает диурез. Обладает антиагрегантным свойством, уменьшает метаболический ацидоз, улучшает микроциркуляцию, оказывает дезинтоксикационное, противошоковое действие.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Плазма-Лит 148 водный раствор не предоставлены.

Показания к применению:

В качестве компонента инфузионной терапии в составе комплексного лечения у взрослых и детей:

— шок;

— термическая травма;

— острая кровопотеря;

— гипотоническая и изотоническая формы гипогидратации и метаболический ацидоз у тяжелых больных;

— для коррекции водно-солевого баланса при остром разлитом перитоните и кишечной непроходимости;

— больные с кишечными свищами;

— декомпенсация электролитных нарушений;

— больные с острыми кишечными инфекциями;

— обезвоживание;

— метаболический ацидоз.

Волемическое действие препарата непродолжительно, при лечении выраженной гиповолемии рекомендуется сочетание с коллоидными растворами, а также кровью и ее компонентами.

Относится к болезням:

- Баланит
- Гипотония
- Инфекции
- Травмы

Противопоказания:

— алкалоз;

— гипертоническая дегидратация;

— случаи, когда противопоказано введение больших объемов жидкости.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют под контролем лабораторных исследований.

Вводят в/в (струйно и капельно). Перед введением раствор подогревают до температуры тела.

Для **взрослых** суточная доза составляет 5-20 мл/кг, при необходимости может быть увеличена до 30- 40 мл/кг. Вводят со скоростью 60-80 капель/мин, допускается струйное введение.

Для **детей** суточная доза составляет 5-10 мл/кг, скорость введения - 30-60 капель/мин.

Курс лечения составляет 3-5 дней.

Побочное действие:

Со стороны обмена веществ: возможна гиперкалиемия.

Местные реакции: возможно раздражение вен и тромбофлебит в месте инъекции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о применении препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не

предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Плазма-Лит 148 водный раствор не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

У пациентов с почечной, сердечной или печеночной недостаточностью необходимо следить за уровнем электролитов в плазме.

Рекомендуется заменять все приспособления для в/в вливания не реже 1 раза/сут. Обязательно внимательное и асептическое смешивание дополнительных веществ. После смешения раствор, если его не вводят немедленно, следует хранить при температуре от 2° до 8°C в течение 24 ч.

Не вводить помутневший раствор или из поврежденной емкости.

При нарушениях функции почек

У пациентов с почечной недостаточностью необходимо следить за уровнем электролитов в плазме.

При нарушениях функции печени

У пациентов с печеночной недостаточностью необходимо следить за уровнем электролитов в плазме.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре до 25°C; не замораживать.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Plazma-Lit_148_Vodnyy_Rastvor