

## [Подорожника большого листа \(порошок\)](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Подорожника большого листа](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### **Форма выпуска:**

◇ <b>Сырье растительное - порошок</b>	<b>1</b> фильтр-пакет
листа подорожника большого	1.5 г

1.5 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.  
1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Настой листьев подорожника усиливает секрецию бронхиальных желез, оказывает муколитическое, противовоспалительное действие, стимулирует выделение желудочного сока, повышает его кислотность.

### **Показания к применению:**

— применяют в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей (бронхитах, трахеитах и т.п.) в составе комплексной терапии.

### **Относится к болезням:**

- [Трахеит](#)

### **Противопоказания:**

- гиперсекреция желудочного сока;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;
- гиперацидный гастрит;

— повышенная чувствительность к препаратам подорожника большого.

## Способ применения и дозы:

3 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, закрывают крышкой и настаивают 20 минут, фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Настой принимают внутрь за 30 минут до еды в течение 7-10 дней: **дети до 3 лет** - по 1 чайной ложке 2 раза в день, **дети от 3 до 6 лет** — по 1 чайной ложке 3 раза в день, **дети от 6 до 12 лет** - по 2 чайные ложки 3 раза в день, **дети старше 12 лет и взрослые** - по 1 столовой ложке 2-3 раза в день.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать..

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, в редких случаях - изжога.

## Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата не рекомендуется с другими противокашлевыми лекарственными средствами, содержащими кодеин, т.к. это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

## Особые указания и меры предосторожности:

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

## Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Podorozhnika\\_bolshogo\\_listya\\_poroshok](http://drugs.thead.ru/Podorozhnika_bolshogo_listya_poroshok)