# Подорожника большого листья (порошок)



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Подорожника большого листья

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

## Форма выпуска:

| ◊ ***Сырье растительное - порошок*** | **1 фильтр-пакет** |
|---|---|
| листья подорожника большого | 1.5 г |

1.5 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.
1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Настой листьев подорожника усиливает секрецию бронхиальных желез, оказывает муколитическое, противовоспалительное действие, стимулирует выделение желудочного сока, повышает его кислотность.

## Показания к применению:

— применяют в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей (бронхитах, трахеитах и т.п.) в составе комплексной терапии.

## Относится к болезням:

- Трахеит

## Противопоказания:

— гиперсекреция желудочного сока;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;

— гиперацидный гастрит;

— повышенная чувствительность к препаратам подорожника большого.

## Способ применения и дозы:

3 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, закрывают крышкой и настаивают 20 минут, фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Настой принимают внутрь за 30 минут до еды в течение 7-10 дней: **дети до 3 лет** - по 1 чайной ложке 2 раза в день, **дети от 3 до 6 лет** — по 1 чайной ложке 3 раза в день, **дети от 6 до 12 лет** - по 2 чайные ложки 3 раза вдень, **дети старше 12 лет и взрослые** - по 1 столовой ложке 2-3 раза в день.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать..

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, в редких случаях - изжога.

## Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата не рекомендуется с другими противокашлевыми лекарственными средствами, содержащими кодеин, т.к. это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

## Особые указания и меры предосторожности:

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

## Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Podorozhnika_bolshogo_listya_poroshok