

## [Полидекса](#)



### Код АТХ:

- [S02CA06](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Дексаметазон](#)
- [Неомицин](#)
- [Полимиксин b](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Капли ушные</b>	<b>1 мл</b>	<b>1 фл.</b>
неомицина сульфат	10 мг (6 500 ЕД)	105 мг (68 250 ЕД)
полимиксина В сульфат	10 000 ЕД	105 000 ЕД
дексаметазона метасульфобензоат натрия	1 мг	10.5 мг

*Вспомогательные вещества:* тиомерсал, лимонная кислота, натрия гидроксид (1N раствор), макрогол 400, полисорбат 80, вода очищенная.

10.5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочной пипеткой - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

### Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в оториноларингологии. Терапевтический эффект препарата Полидекса обусловлен противовоспалительным действием дексаметазона и антибактериальным действием антибиотиков неомидина и полимиксина В. При сочетании указанных антибиотиков расширяется спектр антибактериального действия на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные заболевания наружного и среднего уха.

Неомицин *активен в отношении* *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*.

Полимиксин В *активен в отношении грамотрицательных бактерий*: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Pseudomonas aeruginosa*.

К действию данных антибиотиков *устойчивы* *Streptococcus spp.* (в т.ч. *Streptococcus pneumoniae*) и анаэробные бактерии.

При отсутствии повреждений барабанной перепонки Полидекса не оказывает системного действия.

### Фармакокинетика

Системная абсорбция отсутствует, кроме случаев перфорации барабанной перепонки.

## Показания к применению:

— наружный отит (в частности, инфицированная экзема наружного слухового прохода).

## Относится к болезням:

- [Экзема](#)

## Противопоказания:

- инфекционные или травматические повреждения барабанной перепонки;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-5 капель в каждое ухо 2 раза/сут в течение 6-10 дней.

Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо. После закапывания препарата в одно ухо следует наклонить голову в противоположную сторону на несколько минут, а затем закапать в другое ухо.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции*: редко - кожные проявления.

## Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Полидекса при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимого взаимодействия препарата Полидекса с другими лекарственными средствами не выявлено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед началом лечения необходимо исследовать состояние барабанной перепонки. При перфорации барабанной перепонки применение препарата недопустимо в связи с риском токсического воздействия на вестибулярный и слуховой аппарат.

При аллергии на неомицин возможна перекрестная аллергия с антибиотиками-аминогликозидами.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Polideksa>