Полидекса



Код АТХ:

- S02CA06

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Дексаметазон
- Неомицин
- Полимиксин b

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли ушные	**1 мл**	**1 фл.**
неомицина сульфат	10 мг (6 500 ЕД)	105 мг (68 250 ЕД)
полимиксина В сульфат	10 000 ЕД	105 000 ЕД
дексаметазона метасульфобензоат натрия	1 мг	10.5 мг

Вспомогательные вещества: тиомерсал, лимонная кислота, натрия гидроксид (1N раствор), макрогол 400, полисорбат 80, вода очищенная.

10.5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочной пипеткой - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гормоны и их антагонисты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в оториноларингологии. Терапевтический эффект препарата Полидекса обусловлен противовоспалительным действием дексаметазона и антибактериальным действием антибиотиков неомицина и полимиксина В. При сочетании указанных антибиотиков расширяется спектр антибактериального действия на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные заболевания наружного и среднего уха.

Неомицин *активен в отношении* Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae.

Полимиксин В *активен в отношении грамотрицательных бактерий:* Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa.

К действию данных антибиотиков *устойчивы* Streptococcus spp. (в т.ч. Streptococcus pneumoniae) и анаэробные бактерии.

При отсутствии повреждений барабанной перепонки Полидекса не оказывает системного действия.

Фармакокинетика

Системная абсорбция отсутствует, кроме случаев перфорации барабанной перепонки.

Показания к применению:

— наружный отит (в частности, инфицированная экзема наружного слухового прохода).

Относится к болезням:

- Экзема

Противопоказания:

— инфекционные или травматические повреждения барабанной перепонки;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-5 капель в каждое ухо 2 раза/сут в течение 6-10 дней.

Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо. После закапывания препарата в одно ухо следует наклонить голову в противоположную сторону на несколько минут, а затем закапать в другое ухо.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - кожные проявления.

Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Полидекса при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Полидекса с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед началом лечения необходимо исследовать состояние барабанной перепонки. При перфорации барабанной перепонки применение препарата недопустимо в связи с риском токсического воздействия на вестибулярный и слуховой аппарат.

При аллергии на неомицин возможна перекрестная аллергия с антибиотиками-аминогликозидами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Polideksa