

Полидекса с фенилэфрином



Код АТХ:

- [S02CA06](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Дексаметазон](#)
- [Неомицин](#)
- [Полимиксин b](#)
- [Фенилэфрин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{мнн мнн мнн мнн} [Википедия](#)^{мнн мнн мнн мнн}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Спрей назальный в виде прозрачной бесцветной жидкости.

	100 мл
неомицина сульфат	1 г (650 000 ЕД)
полимиксина В сульфат	1 000 000 ЕД
дексаметазона метасульфобензоат натрия	25 мг
фенилэфрина гидрохлорид	250 мг

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 100 мг, лития хлорид - 340 мг, лимонная кислота - 280 мг, лития гидроксид - 100 мг, макрогол 400 - 5 г, полисорбат 80 - 200 мг, вода очищенная - до 100 мл.

15 мл - флаконы полиэтиленовые с распылителем (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в оториноларингологии. Терапевтический эффект препарата Полидекса с фенилэфрином обусловлен противовоспалительным действием дексаметазона на слизистую оболочку носа, сосудосуживающим действием фенилэфрина и антибактериальным действием антибиотиков неомицина и полимиксина В. При сочетании указанных антибиотиков расширяется спектр антибактериального действия на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные заболевания носовой полости и придаточных пазух.

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Полидекса с фенилэфрином не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

Показания к применению:

Воспалительные и инфекционные заболевания носовой полости, глотки, придаточных пазух носа:

- острый и хронический ринит;
- острый и хронический ринофарингит;
- синуситы.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Ринит](#)
- [Ринофарингит](#)
- [Синусит](#)

Противопоказания:

- подозрение на закрытоугольную глаукому;
- одновременное применение ингибиторов МАО;
- заболевания почек, сопровождающиеся альбуминурией;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- детский возраст до 2.5 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают по 1 впрыскиванию 3-5 раз/сут в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.

Детям в возрасте от 2.5 до 15 лет - по 1 впрыскиванию 3 раза/сут в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - кожные проявления.

Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Полидекса с фенилэфрином противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие обусловлено содержанием фенилэфрина. При одновременном применении гуанетидина и препаратов этой группы усиливается гипертензивный эффект фенилэфрина и, благодаря снижению симпатического тонуса гуанетидином, возможен длительный мидриаз. Если нельзя избежать подобной комбинации, то необходимо наблюдение врача.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не назначают пациентам с почечной недостаточностью.

Не применяют для промывания придаточных пазух носа.

С осторожностью применяют препарат у пациентов с артериальной гипертензией, ИБС, гипертиреозом.

Следует иметь в виду, что препарат содержит компоненты, которые могут дать положительный результат при проведении допинг-контроля у спортсменов.

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение препарата при заболеваниях почек, сопровождающихся альбуминурией.

Препарат не назначают пациентам с почечной недостаточностью.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 2,5 лет. Детям в возрасте от 2,5 до 15 лет назначают по 1 впрыскиванию 3 раза/сут в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Polideksa_S_Fenilefrinom