

## Полидекса с фенилэфрином



### Код АТХ:

- [S02CA06](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Дексаметазон](#)
- [Неомицин](#)
- [Полимиксин b](#)
- [Фенилэфрин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Спрей назальный** в виде прозрачной бесцветной жидкости.

	<b>100 мл</b>
неомицина сульфат	1 г (650 000 ЕД)
полимиксина В сульфат	1 000 000 ЕД
дексаметазона метасульфобензоат натрия	25 мг
фенилэфрина гидрохлорид	250 мг

*Вспомогательные вещества:* метилпарагидроксибензоат - 100 мг, лития хлорид - 340 мг, лимонная кислота - 280 мг, лития гидроксид - 100 мг, макрогол 400 - 5 г, полисорбат 80 - 200 мг, вода очищенная - до 100 мл.

15 мл - флаконы полиэтиленовые с распылителем (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в оториноларингологии. Терапевтический эффект препарата Полидекса с фенилэфрином обусловлен противовоспалительным действием дексаметазона на слизистую оболочку носа, сосудосуживающим действием фенилэфрина и антибактериальным действием антибиотиков неомицина и полимиксина В. При сочетании указанных антибиотиков расширяется спектр антибактериального действия на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные заболевания носовой полости и придаточных пазух.

### Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Полидекса с фенилэфрином не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

## Показания к применению:

Воспалительные и инфекционные заболевания носовой полости, глотки, придаточных пазух носа:

- острый и хронический ринит;
- острый и хронический ринофарингит;
- синуситы.

## Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Ринит](#)
- [Ринофарингит](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

- подозрение на закрытоугольную глаукому;
- одновременное применение ингибиторов МАО;
- заболевания почек, сопровождающиеся альбуминурией;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- детский возраст до 2.5 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** назначают по 1 впрыскиванию 3-5 раз/сут в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.

**Детям в возрасте от 2.5 до 15 лет** - по 1 впрыскиванию 3 раза/сут в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* редко - кожные проявления.

## Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат Полидекса с фенилэфрином противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие обусловлено содержанием фенилэфрина. При одновременном применении гуанетидина и препаратов этой группы усиливается гипертензивный эффект фенилэфрина и, благодаря снижению симпатического тонуса гуанетидином, возможен длительный мидриаз. Если нельзя избежать подобной комбинации, то необходимо наблюдение врача.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат не назначают пациентам с почечной недостаточностью.

Не применяют для промывания придаточных пазух носа.

С осторожностью применяют препарат у пациентов с артериальной гипертензией, ИБС, гипертиреозом.

Следует иметь в виду, что препарат содержит компоненты, которые могут дать положительный результат при проведении допинг-контроля у спортсменов.

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказано применение препарата при заболеваниях почек, сопровождающихся альбуминурией.

Препарат не назначают пациентам с почечной недостаточностью.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 2,5 лет. Детям в возрасте от 2.5 до 15 лет назначают по 1 впрыскиванию 3 раза/сут в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.

## **Условия хранения:**

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Polideksa\\_S\\_Fenilefrinom](http://drugs.thead.ru/Polideksa_S_Fenilefrinom)