Полифепан

Код АТХ:

- A07BC

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лигнин гидролизный

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приема внутрь***	**1 пак.**
лигнин гидролизный	10 г

Пакеты бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.

◊ ***Порошок для приема внутрь***	**1 пак.**
лигнин гидролизный	50 г

Пакеты бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.

◊ ***Порошок для приема внутрь***	**1 пак.**
лигнин гидролизный	100 г

пакеты бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.

◊ ***Порошок для приема внутрь***	**1 пак.**
лигнин гидролизный	250 г

пакеты бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает высокой сорбционной активностью и неспецифическим детоксикационным действием.

В просвете ЖКТ Полифепан связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, аллергены. Препарат сорбирует также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в т.ч. билирубина, холестерина, мочевины, метаболитов, ответственных за развитие эндогенного токсикоза. Полифепан не токсичен, не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 ч.

Показания к применению:

— в качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных токсикозах различного происхождения;

— для оказания первой помощи при острых отравлениях лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами;

— при комплексном лечении пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии, дисбактериозов, диспепсии, а также гнойно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией;

— при печеночной и почечной недостаточности;

— при нарушениях липидного обмена (атеросклероз, ожирение);

— препарат может использоваться для лечения пищевой и лекарственной аллергии;

— применяется для выведения из организма ксенобиотиков.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Атеросклероз
- Дизентерия
- Дисбактериоз
- Диспепсия
- Интоксикация
- Ожирение
- Сальмонеллез
- Токсикоз

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость препарата;

Нежелательно использовать препарат при:

— обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

— атонии кишечника;

— анацидном гастрите.

Способ применения и дозы:

Полифепан принимают внутрь за час до еды и приема других лекарств, размешав в 50-100 мл воды или запивая водой. Доза препарата зависит от тяжести заболевания и составляет 0.5-1.0 г/кг массы тела/сут в 3-4 приема.

Средние дозы: для **детей грудного возраста** - 0.5-1 чайная ложка; **от 1 до 7 лет** – 1 десертная ложка.; **от 7 лет и старше**, а также **взрослым** – 1 столовая ложка на прием 3-4 раза/сут.

Длительность лечения при *острых состояниях* 3-5 дней, при *аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях* - до 14 дней.

Повторные курсы лечения спустя 2 недели.

Побочное действие:

В редких случаях отмечаются аллергические реакции, запор.

Длительное использование энтеросорбента (более 20 дней) может приводить к нарушению всасывания витаминов, кальция, в связи с чем, рекомендуется профилактический прием поливитаминов и препаратов кальция.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь лекарств.

Условия хранения:

Хранить в сухом, прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Polifepan