

Полифепан



Код АТХ:

- [A07BC](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лигнин гидролизный](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

⌘ Порошок для приема внутрь	1 пак.
лигнин гидролизный	10 г
Пакеты бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.	
⌘ Порошок для приема внутрь	1 пак.
лигнин гидролизный	50 г
Пакеты бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.	
⌘ Порошок для приема внутрь	1 пак.
лигнин гидролизный	100 г
пакеты бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.	
⌘ Порошок для приема внутрь	1 пак.
лигнин гидролизный	250 г
пакеты бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает высокой сорбционной активностью и неспецифическим детоксикационным действием.

В просвете ЖКТ Полифепан связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, аллергены. Препарат сорбирует также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в т.ч. билирубина, холестерина, мочевины, метаболитов, ответственных за развитие эндогенного токсикоза. Полифепан не токсичен, не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 ч.

Показания к применению:

- в качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных токсикозах различного происхождения;
- для оказания первой помощи при острых отравлениях лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами;
- при комплексном лечении пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии, дисбактериозов, диспепсии, а также гнойно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией;
- при печеночной и почечной недостаточности;
- при нарушениях липидного обмена (атеросклероз, ожирение);
- препарат может использоваться для лечения пищевой и лекарственной аллергии;
- применяется для выведения из организма ксенобиотиков.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Дизентерия](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Диспепсия](#)
- [Интоксикация](#)
- [Ожирение](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Токсикоз](#)

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость препарата;
- Нежелательно использовать препарат при:
- обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
 - атонии кишечника;
 - анацидном гастрите.

Способ применения и дозы:

Полифепан принимают внутрь за час до еды и приема других лекарств, размешав в 50-100 мл воды или запивая водой. Доза препарата зависит от тяжести заболевания и составляет 0.5-1.0 г/кг массы тела/сут в 3-4 приема.

Средние дозы: для **детей грудного возраста** - 0.5-1 чайная ложка; **от 1 до 7 лет** - 1 десертная ложка.; **от 7 лет и старше**, а также **взрослым** - 1 столовая ложка на прием 3-4 раза/сут.

Длительность лечения при *острых состояниях* 3-5 дней, при *аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях* - до 14 дней.

Повторные курсы лечения спустя 2 недели.

Побочное действие:

В редких случаях отмечаются аллергические реакции, запор.

Длительное использование энтеросорбента (более 20 дней) может приводить к нарушению всасывания витаминов, кальция, в связи с чем, рекомендуется профилактический прием поливитаминов и препаратов кальция.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь лекарств.

Условия хранения:

Хранить в сухом, прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Polifepan>