

[Поликапран](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аминокапроновая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гемостатическое средство, ингибитор фибринолиза. Блокирует действие активаторов пламиногена, угнетает действие пламина, частично ингибирует кинины. Обладает также некоторой противоаллергической активностью и незначительно повышает антитоксическую функцию печени.

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро абсорбируется из ЖКТ, $C_{\max}$ в плазме крови достигается через 2 ч. Широко распределяется в организме, быстро выводится с мочой, главным образом в неизменном виде. Конечный $T_{1/2}$ составляет около 2 ч.

Показания к применению:

Для остановки кровотечений при хирургических вмешательствах и различных патологических состояниях, сопровождающихся повышением фибринолитической активности крови и тканей (после операций на легких, предстательной, поджелудочной и щитовидной железе). Профилактика развития вторичной гиперфибриногенемии при массивных переливаниях консервированной крови.

Относится к болезням:

- [Фиброз](#)

Противопоказания:

Склонность к тромбозам и эмболиям, нарушение функции почек, повышенная чувствительность к аминокапроновой кислоте.

Способ применения и дозы:

Взрослым: внутрь - 5-30 г/сут в 3-6 приемов; в/в вводят 4-5 г в первый час, затем 1 г/ч. *Максимальная суточная доза - 30 г.*

Детям: в/в вводят из расчета 100 мг/кг в первый час, затем 33 мг/кг/ч. *Максимальная суточная доза - 18 г/м².*

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, брадикардия, аритмии.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея.

Прочие: катаральные явления верхних отделов дыхательных путей, головокружение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нецелесообразно применение у женщин с целью профилактики повышенной кровопотери при родах, т.к. возможно возникновение тромбоэмболических осложнений.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять при нарушениях мозгового кровообращения. Не рекомендуется введение аминокапроновой кислоты при гематурии (в связи с опасностью развития острой почечной недостаточности).

При нарушениях функции почек

Противопоказано: нарушение функции почек. Не рекомендуется введение аминокапроновой кислоты при гематурии (в связи с опасностью развития острой почечной недостаточности).

Применение в детском возрасте

Детям: в/в вводят из расчета 100 мг/кг в первый час, затем 33 мг/кг/ч. *Максимальная суточная доза - 18 г/м².*

Источник: <http://drugs.thead.ru/Polikapran>