

Полимурамил



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения в виде бесцветной, прозрачной жидкости.

	0.5 мл
полимурамил	200 мкг

0.5 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые картонные (1) - пачки картонные.

0.5 мл - ампулы (5) - пачки картонные.

0.5 мл - ампулы (10) - упаковки ячейковые картонные (1) - пачки картонные.

0.5 мл - ампулы (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Полимурамил является природным иммуностимулятором. Он усиливает поглощение бактерий и килинг бактерий фагоцитарными клетками. При этом усиливается способность моноцитов, макрофагов и дендритных клеток продуцировать цитокины (интерлейкин-12, фактор некроза опухоли- α , гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор и др.), активирующие клеточный и гуморальный иммунитет. Полимурамил усиливает синтез антител и повышает функциональную активность естественных киллеров, играющих важную роль в противовирусном и противоопухолевом иммунитете. Полимурамил не имеет тератогенных, эмбриотоксических, мутагенных и канцерогенных свойств.

Показания к применению:

Полимурамил применяется у взрослых одновременно с антибактериальными препаратами в комплексной терапии:

— вторичных иммунодефицитных состояний, проявляющихся в виде хронических, вялотекущих, рецидивирующих инфекционно-воспалительных процессов любой локализации (кожа и мягкие ткани; ЛОР-органы, урогенитальный тракт и т.д.);

— при острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей, включая все виды пиодермии, в т.ч. фурункулез, карбункулы; абсцессы, флегмоны;

— для лечения и профилактики хирургических инфекций, в т.ч. гнойно-септических осложнений.

Относится к болезням:

- [Абсцесс](#)
- [Инфекции](#)
- [Карбункул](#)
- [Флегмона](#)
- [Фурункул](#)

Противопоказания:

- беременность;
- лактация;
- детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Полимурамил вводят внутримышечно в дозе 200 мкг/0,5мл ежедневно. Длительность введения определяется клинической картиной. Рекомендуемая длительность введения от 5 до 7 дней.

Побочное действие:

Возможно временное повышение температуры до 37,5°C, озноб, болезненность в месте введения.

Передозировка:

При передозировке возможно повышение температуры, при фебрильных значениях температуры следует проводить симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Полимурамил противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат совместим со всеми противомикробными и противовоспалительными лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8°C. Не замораживать.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Polimuramil>