# <u>Полинадим</u>



# Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Дифенгидрамин
- Нафазолин

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр<sup>МНН МНН</sup> Википедия<sup>МНН МНН</sup> РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

# Форма выпуска:

◊ Капли глазные в виде прозрачной, слабоокрашенной жидкости.

	1 мл
дифенгидрамин	1 мг
нафазолин	250 мкг

Вспомогательные вещества: борная кислота (15 мг/мл), метилцеллюлоза водорастворимая (1.5 мг/мл), натрия тетрабората декагидрат (500 мкг/мл), динатрия эдетат (600 мкг/мл), вода д/и (до 1 мл).

10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в офтальмологии.

Дифенгидрамин - блокатор гистаминовых  $H_1$ -рецепторов, оказывает противоаллергическое действие. Уменьшает отек, зуд, слезотечение.

Нафазолин - альфа-адреномиметик, вызывает длительное сужение периферических сосудов. Благодаря сосудосуживающему действию при местном применении оказывает противоотечное действие.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Полинадим не предоставлены.

# Показания к применению:

- острый аллергический конъюнктивит (в т.ч. поллинозный конъюнктивит);
- конъюнктивит при лекарственной аллергии;

— инфекционные заболевания глаз с острым аллергическим компонентом (в качестве дополнительного средства).

#### Относится к болезням:

- Аллергия
- Инфекции
- Конъюнктивит
- Поллиноз

# Противопоказания:

- ксероз конъюнктивы (сухой кератоконъюнктивит, синдром Шегрена);
- одновременное применение с ингибиторами МАО и период в течение 10 дней после их отмены;
- закрытоугольная глаукома;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат при тиреотоксикозе, артериальной гипертензии, атеросклерозе, аритмии, хроническом рините, бронхиальной астме, аденоме надпочечников, у пациентов пожилого возраста, при доброкачественной гиперплазии предстательной железы с наличием остаточной мочи.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** при *острых симптомах* препарат назначают по 1 капле в конъюнктивальный мешок каждые 3 ч до уменьшения отека и раздражения глаз, затем - по 1 капле 2-3 раза/сут до исчезновения клинических симптомов.

Детям старше 2 лет назначают 1-2 капли/сут.

Продолжительность лечения - не более 5 дней. Необходимость более длительного применения препарата врач решает индивидуально.

При сохранении симптомов раздражения конъюнктивы более 72 ч следует прекратить применение препарата.

## Побочное действие:

Местные реакции: симптомы раздражения конъюнктивы (жжение в области глаз, гиперемия конъюнктивы, зуд), а также нарушение зрения, повышение внутриглазного давления, мидриаз, боль в глазах, сухость слизистой оболочки носа. Эти реакции исчезают после отмены препарата. Описан единичный случай помутнения роговицы (при применении в течение 7 дней не менее 10 раз/сут), которое исчезло после прекращения лечения препаратом.

Системные реакции: редко (особенно у детей и пациентов пожилого возраста) - бледность кожных покровов, тахикардия, боли в области сердца, повышение АД, усиление потоотделения, дрожь, головная боль, возбуждение, тошнота, сонливость, головокружение.

### Передозировка:

При местном применении препарата передозировка маловероятна.

*Симптомы:* у детей в возрасте до 6 лет при длительном и частом применении возможно угнетение ЦНС, гипотермия, длительный мидриаз, повышение АД, тахикардия.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

# Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами возможно усиление сосудосуживающего действия нафазолина.

Применение ингибиторов MAO одновременно с нафазолином или в течение 10 дней после их отмены может привести  $\kappa$  гипертоническому кризу.

# Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять препарат чаще, чем через каждые 3 ч (в течение 5 дней).

Препарат не предназначен для приема внутрь или введения в виде инъекций.

В случае появления симптомов, свидетельствующих о системном всасывании, необходимо прекратить применение препарата.

При симптомах аллергии и во время лечения препаратом не рекомендуется использовать мягкие контактные линзы. Если их применение необходимо, то линзы следует снимать перед инстилляцией и устанавливать обратно, не ранее чем через 15 мин.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Поскольку после инстилляции временно нарушается четкость зрения, сразу после применения препарата пациентам следует воздерживаться от вождения автотранспорта и деятельности, требующей четкости зрения.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 2 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от  $15^{\circ}$  до  $25^{\circ}$ C; не замораживать.

После вскрытия флакона срок хранения препарата - 1 мес.

### Срок годности:

2 года.

#### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Polinadim