

[Полисорб МП](#)



Код АТХ:

- [A07B](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кремния диоксид коллоидный](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь** легкий, белый или белый с голубоватым оттенком, без запаха; при взбалтывании с водой образует взвесь.

	1 пакетик
кремния диоксид коллоидный	3 г

Пакетики одноразового использования.

Пакетики одноразового использования (10) - пачки картонные.

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь** легкий, белый или белый с голубоватым оттенком, без запаха; при взбалтывании с водой образует взвесь.

	1 банка
кремния диоксид коллоидный	12 г
"_	25 г
"_	50 г

Банки пластиковые.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Полисорб МП - неорганический неселективный полифункциональный энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема с размерами частиц до 0.09 мкм и с химической формулой SiO₂.

Полисорб МП обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами.

В просвете ЖКТ препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая, патогенные бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, алкоголь. Полисорб МП сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в т.ч. избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза.

Фармакокинетика

После приема препарата Полисорб МП внутрь активное вещество не расщепляется и не всасывается в ЖКТ. Быстро выводится из организма в неизменном виде.

Показания к применению:

- острые и хронические интоксикации различной этиологии у детей и взрослых;
- острые кишечные инфекции различной этиологии, включая пищевые токсикоинфекции, а также диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз (в составе комплексной терапии);
- гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;
- острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в т.ч. лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов;
- пищевая и лекарственная аллергия;
- гипербилирубинемия (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность);
- жителям экологически неблагоприятных регионов и работникам вредных производств с целью профилактики.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Диарея](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Желтуха](#)
- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)
- [Токсикоз](#)

Противопоказания:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- желудочно-кишечные кровотечения;
- атония кишечника;
- индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы:

Полисорб МП принимают внутрь только в виде водной суспензии. Для получения суспензии необходимое количество препарата тщательно размешивают в 1/4-1/2 стакана воды. Рекомендуется готовить свежую суспензию перед каждым приемом препарата и выпивать ее за 1 ч до еды или приема других препаратов.

Полисорб МП

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Взрослым препарат Полисорб МП назначают в средней суточной дозе 0.1-0.2 г/кг массы тела (6-12 г). Кратность приема - 3-4 раза/сут. Максимальная суточная доза у **взрослых** составляет 0.33 г/кг массы тела (20 г).

Суточная доза Полисорба МП для **детей** зависит от массы тела (см.таблицу).

Таблица рекомендуемых доз Полисорба МП.

Масса тела пациента	Доза	Объем воды
до 10 кг	0.5-1.5 чайной ложки/сут	30-50 мл
11-20 кг	1 чайная ложка "без горки" на 1 прием	30-50 мл
21-30 кг	1 чайная ложка "с горкой" на 1 прием	50-70 мл
31-40 кг	2 чайные ложки "с горкой" на 1 прием	70-100 мл
41-60 кг	1 столовая ложка "с горкой" на 1 прием	100 мл
более 60 кг	1-2 столовые ложки "с горкой" на 1 прием	100-150 мл

1 чайная ложка "с горкой" = 1 г препарата.

1 столовая ложка "с горкой" = 2.5-3 г препарата.

При *пищевой аллергии* препарат следует принимать непосредственно перед приемом пищи. Суточную дозу делят на 3 приема в течение дня.

Длительность лечения зависит от диагноза и тяжести заболевания. Курс лечения при *острых интоксикациях* составляет 3-5 дней; при *аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях* - до 10-14 дней. Через 2-3 недели возможно повторение курса лечения.

Особенности применения Полисорба МП при различных заболеваниях и состояниях

При *пищевой токсикоинфекции и острых отравлениях* терапию рекомендуют начать с промывания желудка 0.5-1% взвесью Полисорба МП. При тяжелых отравлениях в первые сутки промывание желудка проводят через зонд каждые 4-6 ч, наряду с этим препарат дают и внутрь. Разовая доза у **взрослых** составляет 0.1-0.15 г/кг массы тела больного 2-3 раза/сут.

При *острых кишечных инфекциях* лечение Полисорбом МП рекомендуют начинать в первые часы или сутки заболевания в составе комплексной терапии. В первые сутки суточную дозу препарата принимают в течение 5 ч с интервалом между приемами в 1 ч. Во вторые сутки кратность приема препарата - 4 раза/сут. Продолжительность лечения - 3-5 дней.

При *лечении вирусного гепатита* Полисорб МП используют как детоксикационное средство в средней суточной дозе в течение первых 7-10 дней болезни.

При *острых аллергических реакциях* (лекарственных или пищевых) рекомендуют предварительное промывание желудка и кишечника 0.5-1% взвесью Полисорба МП. Далее препарат назначают в обычных дозах до наступления клинического эффекта.

При *хронической пищевой аллергии* рекомендуют курсы терапии Полисорба МП продолжительностью 7-10-15 дней. Препарат принимают непосредственно перед едой. Аналогичные курсы назначают при *острой рецидивирующей крапивнице, отеке Квинке, эозинофилии, поллинозах и других atopических заболеваниях*.

При *хронической почечной недостаточности* используют курсы лечения препаратом Полисорб МП в дозе 0.1-0.2 г/кг/сут в течение 25-30 дней с перерывом 2-3 недели.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции, запор.

Передозировка:

В настоящее время данных о передозировке препарата Полисорб МП не имеется.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Назначение препарата Полисорб МП при беременности не оказывает отрицательное воздействие на плод. При применении Полисорба МП в период лактации не установлено неблагоприятных воздействий на ребенка.

Возможно применение препарата Полисорб МП при беременности и в период лактации по показаниям и в рекомендованных дозах.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата Полисорб МП с другими лекарственными средствами возможно снижение терапевтического эффекта последних.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном приеме препарата Полисорб МП (более 14 дней) возможно нарушение всасывания витаминов и кальция, в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминных препаратов и препаратов, содержащих кальций.

Наружно порошок Полисорба МП можно использовать при комплексном лечении гнойных ран, трофических язв и ожогов.

При нарушениях функции почек

Возможно использование по показаниям

Применение в детском возрасте

Суточная доза Полисорба МП для **детей** зависит от массы тела.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 5 лет.

После вскрытия упаковки препарат следует хранить в плотно закрывающейся емкости. Срок хранения суспензии - не более 48 ч.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Polisorb_MP