

## Полиспонин



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки** от светло-коричневого до коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрической формы, с фаской.

	<b>1 таб.</b>
экстракт корневищ с корнями диоскореи ниппонской (экстракт сухой с содержанием суммы фураностаноловых агликонов в пересчете на диосгенин и абсолютно сухое вещество 1 %)	100 мг

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат 17 мг, крахмал картофельный 13 мг, магния оксид 7 мг, кальция стеарат 3 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Снижает уровень холестерина, повышает содержание фосфолипидов в крови и снижает коэффициент холестерин/фосфолипиды; снижает артериальное давление.

### Показания к применению:

— гиперхолестеринемия (легкая и умеренная);

— атеросклероз сосудов головного мозга как в начальных его стадиях (в целях профилактики), так и при выраженных формах заболевания; при атеросклерозе сосудов сердца и при сочетании атеросклероза с гипертонической болезнью (в составе комплексной терапии).

### Относится к болезням:

- [Атеросклероз](#)
- [Гипертоническая болезнь](#)
- [Гипертония](#)

- [Гиперхолестеринемия](#)
- [Холера](#)

## **Противопоказания:**

- дефицит лактазы;
- непереносимость лактозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* артериальная гипотония.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь. По 1-2 таблетки 2-3 раза в день после еды. Лечение проводят циклами по 20-30 дней с 7-10-дневными перерывами. Курс лечения 3-4 месяца.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции (кожный зуд), снижение аппетита, повышенное потоотделение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## **Передозировка:**

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не установлено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Polisponin>