

Полиспонин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки от светло-коричневого до коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрической формы, с фаской.

	1 таб.
экстракт корневищ с корнями диоскореи ниппонской (экстракт сухой с содержанием суммы фуранолигнанных агликонов в пересчете на диосгенин и абсолютно сухое вещество 1 %)	100 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 17 мг, крахмал картофельный 13 мг, магния оксид 7 мг, кальция стеарат 3 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Снижает уровень холестерина, повышает содержание фосфолипидов в крови и снижает коэффициент холестерин/фосфолипиды; снижает артериальное давление.

Показания к применению:

— гиперхолестеринемия (легкая и умеренная);

— атеросклероз сосудов головного мозга как в начальных его стадиях (в целях профилактики), так и при выраженных формах заболевания; при атеросклерозе сосудов сердца и при сочетании атеросклероза с гипертонической болезнью (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Атеросклероз](#)
- [Гипертоническая болезнь](#)
- [Гипертония](#)

- [Гиперхолестеринемия](#)
- [Холера](#)

Противопоказания:

- дефицит лактазы;
- непереносимость лактозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: артериальная гипотония.

Способ применения и дозы:

Внутрь. По 1-2 таблетки 2-3 раза в день после еды. Лечение проводят циклами по 20-30 дней с 7-10-дневными перерывами. Курс лечения 3-4 месяца.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (кожный зуд), снижение аппетита, повышенное потоотделение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Polisponin>