

## Полижинакс



### Код АТХ:

- [G01AA51](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Неомицин](#)
- [Нистатин](#)
- [Полимиксин b](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капсулы вагинальные** мягкие, от бледно-желтого до бежевого цвета, овальные; содержимое капсул - полужидкая однородная масса от желтого до коричневого цвета.

|                       | <b>1 капс.</b> |
|-----------------------|----------------|
| неомицина сульфат     | 35 000 МЕ      |
| полимиксина В сульфат | 35 000 МЕ      |
| нистатин              | 100 000 МЕ     |

**Вспомогательные вещества:** Тефоз 63 - 125 мг, масло соевое гидрогенизированное - 30 мг, диметикон 1000 - до 2500 мг.

**Состав оболочки капсулы:** желатин - 381.2 мг, глицерол - 191.5 мг, диметикон 1000 - 86.9 мг.

6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат с антибактериальным и противогрибковым действием для местного применения в гинекологии. Оказывает бактерицидное действие.

Неомицин и полимиксин В активны в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Streptococcus spp. и анаэробные бактерии нечувствительны к этим антибиотикам.

Нистатин оказывает фунгицидное действие в отношении грибов рода Candida.

Препарат улучшает трофические процессы в слизистой оболочке влагалища.

#### **Фармакокинетика**

Равномерно распределяется на слизистой оболочке влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой оболочки влагалища.

### **Показания к применению:**

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными микроорганизмами:

- неспецифические вагиниты;
- грибковые вагиниты;
- смешанные вагиниты;
- вульвовагиниты;
- цервиковагиниты.

Профилактика инфекционных осложнений:

- перед операционными гинекологическими вмешательствами;
- до и после диатермокоагуляции шейки матки;
- перед внутриматочными диагностическими процедурами;
- перед родами.

### **Относится к болезням:**

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)
- [Диатез](#)
- [Инфекции](#)

### **Противопоказания:**

- I триместр беременности;
- период лактации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Лежа на спине, 1 капсулу вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. Курс лечения - 12 дней. Профилактический курс - 6 дней.

В случае пропуска одной или нескольких доз следует возобновить лечение в обычной дозе.

### **Побочное действие:**

*Возможны:* аллергические реакции, жжение, зуд, раздражение во влагалище; аллергическая контактная эритема.

При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.

## **Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Полижинакс не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано применение препарата в I триместре беременности. Применение во II и III триместрах беременности возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Противопоказано применение в период лактации. При необходимости использования препарата в данный период кормление грудью следует прекратить.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не рекомендуется использовать Полижинакс одновременно со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа.

Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.

Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.

Не следует прерывать курс лечения во время менструации.

Пациент должен быть предупрежден о необходимости сообщить лечащему врачу об усугублении любых из указанных в инструкции побочных эффектов или о появлении других побочных эффектов, не указанных в инструкции.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Polizhinaks>