Полижинакс

Код АТХ:

- G01AA51

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Неомицин
- Нистатин
- Полимиксин b

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы вагинальные мягкие, от бледно-желтого до бежевого цвета, овальные; содержимое капсул - полужидкая однородная масса от желтого до коричневого цвета.

	1 капс.
неомицина сульфат	35 000 МЕ
полимиксина B сульфат	35 000 МЕ
нистатин	100 000 МЕ

Вспомогательные вещества: Тефоз 63 - 125 мг, масло соевое гидрогенизированное - 30 мг, диметикон 1000 - до 2500 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин - 381.2 мг, глицерол - 191.5 мг, диметикон 1000 - 86.9 мг.

6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с антибактериальным и противогрибковым действием для местного применения в гинекологии. Оказывает бактерицидное действие.

Неомицин и полимиксин B активны в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Streptococcus spp. и анаэробные бактерии нечувствительны к этим антибиотикам.

Нистатин оказывает фунгицидное действие в отношении грибов рода Candida.

Препарат улучшает трофические процессы в слизистой оболочке влагалища.

Фармакокинетика

Равномерно распределяется на слизистой оболочке влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой оболочки влагалища.

Показания к применению:

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными микроорганизмами:

— неспецифические вагиниты;

— грибковые вагиниты;

— смешанные вагиниты;

— вульвовагиниты;

— цервиковагиниты.

Профилактика инфекционных осложнений:

— перед операционными гинекологическими вмешательствами;

— до и после диатермокоагуляции шейки матки;

— перед внутриматочными диагностическими процедурами;

— перед родами.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит
- Диатез
- Инфекции

Противопоказания:

— I триместр беременности;

— период лактации;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Лежа на спине, 1 капсулу вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. Курс лечения - 12 дней. Профилактический курс - 6 дней.

В случае пропуска одной или нескольких доз следует возобновить лечение в обычной дозе.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции, жжение, зуд, раздражение во влагалище; аллергическая контактная эритема.

При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Полижинакс не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата в I триместре беременности. Применение во II и III триместрах беременности возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Противопоказано применение в период лактации. При необходимости использования препарата в данный период кормление грудью следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется использовать Полижинакс одновременно со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа.

Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.

Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.

Не следует прерывать курс лечения во время менструации.

Пациент должен быть предупрежден о необходимости сообщить лечащему врачу об усугублении любых из указанных в инструкции побочных эффектов или о появлении других побочных эффектов, не указанных в инструкции.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять траспортными средствами и другими механизмами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Polizhinaks