## Полижинакс Вирго



## Код АТХ:

• G01AA51

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Неомицин
- Нистатин
- Полимиксин b

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр МНН МНН ВИКИПЕДИЯ МНН МНН МНН РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com ВНГЛ

### Форма выпуска:

**Эмульсия для интравагинального введения в капсулах** от светло-желтого до светло-коричневого цвета, мягких, овальной формы с заостренным вытянутым концом; содержимое капсул - маслянистая эмульсия от светло-желтого до коричневого цвета.

	1 капс.
неомицина сульфат	В5 000 ME
полимиксина В сульфат	β5 000 ME
нистатин	100 000 ME

Вспомогательные вещества: масло соевое гидрогенизированное, диметикон 1000, Тефоз 63, эфиры пальмитиновой кислоты, эфиры стеариновой кислоты.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол, диметикон 1000, вода очищенная.

3 шт. - блистеры (1) - пачки картонные. 3 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

# Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Оказывает бактерицидное действие на грамположительные (Staphylococus aureus, коринебактерии и др.) и грамотрицательные микроорганизмы (Enterococus faccium, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Hemophilus influenzae, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Ureaplasma urealyticum). Обладает фунгицидным действием на патогенные грибы, особенно дрожжеподобные рода Candida albicans, Cryptococcus, Hystoplasma. Улучшает трофические процессы в слизистой влагалища.

#### Фармакокинетика

Равномерно распределяется по слизистой влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой влагалища.

### Показания к применению:

Лечение

— неспецифические, грибковые, смешанные вагиниты, вульвовагиниты и цервиковагиниты;

Профилактика

- перед хирургическим вмешательством в области половых органов;
- перед внутриматочными диагностическими процедурами.

#### Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит

#### Противопоказания:

— аллергическая реакция на любой компонент препарата.

### Способ применения и дозы:

Для интравагинального введения. По одной капсуле после вечернего туалета, перед сном. Надрезав заостренный конец, и, слегка нажимая на капсулу, вводят содержимое капсулы во влагалище. После введения лекарственного препарата во влагалище, капсулу выбрасывают в мусор. Курс лечения 6 дней.

С целью профилактики препарат применяют в течение 6 дней.

В случае пропуска приема препарата возобновить лечение необходимо в обычной дозе.

#### Побочное действие:

Аллергические реакции на компоненты препарата.

При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов, усиливающееся в случаях почечной недостаточности.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Вво время беременности не рекомендуется применять без консультации врача. Если во время лечения Вы обнаружите, что беременны, обратитесь к врачу, т.к. только он сможет принять решение о необходимости продолжить лечение.

Во время кормления грудью применения препарата необходимо избегать.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется использовать в сочетании со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат разработан специально для применения у девочек и девушек-подростков.

Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.

В случае почечной недостаточности обратитесь за консультацией к врачу.

Во время лечения необходимо воздерживаться от применения внутривлагапищных тампонов. Не следует прерывать курс лечения во время менструации.

### Условия хранения:

Хранить при температуре от 15° до 25°C, в недоступном для детей месте. Срок годности - 1.5 года.

### Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Polizhinaks\_Virgo