Полькортолон (мазь)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Триамцинолон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь 0.1%*** для наружного применения в виде белой или почти белой просвечивающей жирной массы с запахом мазевой основы.

	1 г
триамцинолона ацетонид	1 мг

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

ГКС для наружного применения. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное, противоотечное действие. Тормозит накопление макрофагов, лейкоцитов в зоне воспаления. Уменьшает проницаемость капилляров, препятствуя образованию отеков.

Уменьшает проявления воспалительных реакций со стороны кожи, особенно аллергического происхождения.

Фармакокинетика

Триамцинолон легко проникает в роговой слой кожи, не подвергается биотрансформации и может накапливаться в клетках рогового слоя кожи. В незначительной степени проникает в системный кровоток, метаболизируется в печени. Абсорбция более выражена у детей, чем у взрослых, повышается при применении на обширных участках кожи, на лице, в области кожных складок, при применении под окклюзионными повязками. Кумуляция триамцинолона в коже увеличивается при частом применении препарата. Связывание с белками плазмы - 40%. $T_{1/2}$ - 5 ч. Выводится преимущественно почками в виде неактивных метаболитов.

Показания к применению:

—дерматит (в т.ч. контактный, аллергический, себорейный);

—экзема;

—строфулюс;

—почесуха;

—укусы насекомых;

—мультиформная эритема.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Себорея
- Экзема
- Эритема

Противопоказания:

—туберкулез кожи;

—вирусные и грибковые заболевания кожи;

—ветряная оспа;

—новообразования кожи;

—предраковые состояния кожи;

—розовые и вульгарные угри;

—периоральный дерматит;

—трофические язвы голеней на фоне варикозного расширения вен;

—детский возраст до 2 лет;

—повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем на кожу в области поражения и втирают. В начале лечения частота применения составляет 2-3 раза/сут, затем - 1-2 раза/сут. Длительность лечения составляет 1-2 недели. На коже лица препарат следует применять не более 7 дней.

В случае чрезмерной лихенизации или гиперкератоза препарат применяют под окклюзионной повязкой 1 раз в течение 24-48 ч.

Детям старше 2 лет препарат следует назначать 1 раз/сут на небольшие поверхности кожи, не затрагивая кожу лица.

Побочное действие:

Местные реакции: при длительном применении в области нанесения препарата возможен чрезмерный рост эпидермиса, атрофия подкожно-жировой клетчатки, стрии, раздражение кожи, покраснение кожи, гиперкератоз, замедление процесса заживления, кожные кровоизлияния, кровоподтеки.

Передозировка:

Случаи передозировки наблюдаются редко.

Симптомы: при частом или длительном применении в значительных количествах на обширных участках возможно развитие симптомов системного действия препарата (повышение АД, отеки, иммунодепрессивное действие).

Лечение: отмена препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется назначать Полькортолон при беременности и в период лактации. В исключительных случаях и с осторожностью возможно кратковременное применение препарата на ограниченных участках кожи.

Не применять на коже молочных желез.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Во время лечения не проводить вакцинацию против оспы. Не следует проводить и другие виды иммунизации в связи с иммунодепрессивным действием ГКС.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять препарат у пациентов со слабо выраженной подкожно-жировой клетчаткой, особенно у больных пожилого возраста.

Не втирать препарат в кожу лица в связи с риском развития побочного действия: стойкое расширение мелких кровеносных сосудов (телеангиэктазии), атрофия подкожно-жировой клетчатки в области рта, даже после короткого периода применения.

Следует избегать попадания препарата на кожу вокруг глаз.

При появлении раздражения кожи препарат следует отменить.

Пациента следует предупредить о необходимости обращения к врачу при появлении побочных эффектов. Пациент не должен превышать длительность применения препарата без назначения врача.

Использование в педиатрии

Не применять препарат у **детей в возрасте до 2 лет**.

Применение в пожилом возрасте

С осторожностью следует применять препарат у пациентов со слабо выраженной подкожно-жировой клетчаткой, особенно у больных пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 2 лет.

Детям старше 2 лет препарат следует назначать 1 раз/сут на небольшие поверхности кожи, не затрагивая кожу лица.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Polkortolon_maz