

[Полькортолон \(мазь\)](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Триамцинолон](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь 0.1%** для наружного применения в виде белой или почти белой просвечивающей жирной массы с запахом мазевой основы.

	1 г
Триамцинолона ацетонид	1 мг

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

ГКС для наружного применения. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противоэдематозное, противоотечное действие. Тормозит накопление макрофагов, лейкоцитов в зоне воспаления. Уменьшает проницаемость капилляров, препятствуя образованию отеков.

Уменьшает проявления воспалительных реакций со стороны кожи, особенно аллергического происхождения.

Фармакокинетика

Триамцинолон легко проникает в роговой слой кожи, не подвергается биотрансформации и может накапливаться в клетках рогового слоя кожи. В незначительной степени проникает в системный кровоток, метаболизируется в печени. Абсорбция более выражена у детей, чем у взрослых, повышается при применении на обширных участках кожи, на лице, в области кожных складок, при применении под окклюзионными повязками. Кумуляция триамцинолона в коже увеличивается при частом применении препарата. Связывание с белками плазмы - 40%. $T_{1/2}$ - 5 ч. Выводится преимущественно почками в виде неактивных метаболитов.

Показания к применению:

- дерматит (в т.ч. контактный, аллергический, себорейный);
- экзема;
- строфулюс;

- почесуха;
- укусы насекомых;
- мультиформная эритема.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Себорея](#)
- [Экзема](#)
- [Эритема](#)

Противопоказания:

- туберкулез кожи;
- вирусные и грибковые заболевания кожи;
- ветряная оспа;
- новообразования кожи;
- предраковые состояния кожи;
- розовые и вульгарные угри;
- периоральный дерматит;
- трофические язвы голеней на фоне варикозного расширения вен;
- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем на кожу в области поражения и втирают. В начале лечения частота применения составляет 2-3 раза/сут, затем - 1-2 раза/сут. Длительность лечения составляет 1-2 недели. На коже лица препарат следует применять не более 7 дней.

В случае чрезмерной лихенизации или гиперкератоза препарат применяют под окклюзионной повязкой 1 раз в течение 24-48 ч.

Детям старше 2 лет препарат следует назначать 1 раз/сут на небольшие поверхности кожи, не затрагивая кожу лица.

Побочное действие:

Местные реакции: при длительном применении в области нанесения препарата возможен чрезмерный рост эпидермиса, атрофия подкожно-жировой клетчатки, стрии, раздражение кожи, покраснение кожи, гиперкератоз, замедление процесса заживления, кожные кровоизлияния, кровоподтеки.

Передозировка:

Случаи передозировки наблюдаются редко.

Симптомы: при частом или длительном применении в значительных количествах на обширных участках возможно развитие симптомов системного действия препарата (повышение АД, отеки, иммунодепрессивное действие).

Лечение: отмена препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется назначать Полькортолон при беременности и в период лактации. В исключительных случаях и с осторожностью возможно кратковременное применение препарата на ограниченных участках кожи.

Не применять на коже молочных желез.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Во время лечения не проводить вакцинацию против оспы. Не следует проводить и другие виды иммунизации в связи с иммунодепрессивным действием ГКС.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять препарат у пациентов со слабо выраженной подкожно-жировой клетчаткой, особенно у больных пожилого возраста.

Не втирать препарат в кожу лица в связи с риском развития побочного действия: стойкое расширение мелких кровеносных сосудов (телеангиэктазии), атрофия подкожно-жировой клетчатки в области рта, даже после короткого периода применения.

Следует избегать попадания препарата на кожу вокруг глаз.

При появлении раздражения кожи препарат следует отменить.

Пациента следует предупредить о необходимости обращения к врачу при появлении побочных эффектов. Пациент не должен превышать длительность применения препарата без назначения врача.

Использование в педиатрии

Не применять препарат у **детей в возрасте до 2 лет**.

Применение в пожилом возрасте

С осторожностью следует применять препарат у пациентов со слабо выраженной подкожно-жировой клетчаткой, особенно у больных пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 2 лет.

Детям старше 2 лет препарат следует назначать 1 раз/сут на небольшие поверхности кожи, не затрагивая кожу лица.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Polkortolon_maz