Полудан

Код АТХ:

- S01AD

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Полиадениловая кислота
- Полиуридиловая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Лиофилизат для приготовления назальных капель*** белого цвета.

	1 фл.
комплекс полиадениловой и полиуридиловой кислот	100 ЕД
в т.ч. полирибоадениловой кислоты калиевая соль (калия полирибоаденилат)	100 мкг
в т.ч. полирибоуридиловой кислоты калиевая соль (калия полирибоуридилат)	107 мкг

Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат (натрий фосфорнокислый 2-замещенный), калия дигидрофосфат (калий фосфорнокислый 1-замещенный безводный), натрия хлорид.

Флаконы объемом 5 мл (1) в комплекте с крышками-капельницами (1) - пачки картонные.
Флаконы объемом 5 мл (3) в комплекте с крышками-капельницами (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусный и иммуномодулирующий препарат. Индуктор синтеза интерферона.

Полудан - биосинтетический полирибонуклеотидный комплекс полирибоадениловой и полирибоуридиловой кислот. Индуктор синтеза эндогенного интерферона и других цитокинов. Стимулирует образование в основном альфа-интерферона, в меньшей степени - бета- и гамма-интерферона. Индуцирует синтез интерферона в лейкоцитах периферической крови, а также в тканях и органах, содержащих лимфоидные элементы. Высокий уровень интерферона поддерживается ежедневными введениями на протяжении всего курса. Обладает прямым противовирусным действием в отношении вирусов гриппа и других ОРВИ. Модулирует цитокиновый ответ при инфицировании клеток вирусом.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

— грипп и другие ОРВИ.

Относится к болезням:

- Грипп

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять местно.

Взрослым закапывать по 2 кап. в каждую ноздрю 5 раз/сут в течение 5 дней в острый период заболевания (не позднее 24-48 ч с момента появления первых симптомов).

Раствор Полудана готовят путем растворения содержимого флакона (100 ЕД) кипяченой водой до метки, указанной на этикетке.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные по применению препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клиническая эффективность Полудана уменьшается при одновременном применении с ферментными препаратами в связи с разрушающим действием ферментов на эндогенный интерферон.

Полудан совместим с антибиотиками и лекарственными средствами для лечения вирусных инфекций.

Особые указания и меры предосторожности:

Побочные явления носят транзиторный характер и исчезают после отмены препарата через 1-3 суток.

Применение в детском возрасте

Препарат назначают взрослым.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 4°C. Срок годности - 4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Poludan