Полудан (капли)

Код АТХ:

- S01AD

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Полиаденциловая кислота
- Полиуридиловая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Лиофилизат для приготовления назальных капель*** белого цвета.

	1 мл
комплекс полиаденциловой и полиуридиловой кислот	50 ЕД
в т.ч. полирибоаденциловой кислоты калиевая соль (калия полирибоаденилат)	50 мкг
в т.ч. полирибоуридиловой кислоты калиевая соль (калия полирибоуридилат)	53.5 мкг

5 мл - флаконы (1) в комплекте с крышками-капельницами (1) - пачки картонные.
5 мл - флаконы (3) в комплекте с крышками-капельницами (3) - пачки картонные.
5 мл - флаконы (100) в комплекте с крышками-капельницами (100) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Полудан - биосинтететический полирибонуклеотидный комплекс полирибоаденциловой и полирибоуридиловой кислот. Индуктор синтеза, эндогенного интерферона. Стимулирует образование в основном альфа-интерферона, в меньшей степени бета- и гамма-интерферона. Индуцирует синтез интерферона в лейкоцитах периферической крови, а также в тканях и органах, содержащих лимфоидные элементы. Высокий уровень интерферона поддерживается ежедневными введениями на протяжений всего курса. Обладает прямым антивирусным действием в отношении вирусов гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Модулирует цитокиновый ответ при инфицировании клеток вирусом.

Показания к применению:

— лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Относится к болезням:

- Грипп
- Инфекции

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Местно.

Для *лечения гриппа и других острых вирусных респираторных инфекций* у **взрослых** по 2 капли в каждую ноздрю 5 раз в день в течение 5 дней в острый период заболевания — не позднее 24-48 часов с момента появления первых симптомов.

Побочное действие:

Редко возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата Полудан с ферментными препаратами в связи с разрушающим действием ферментов на эндогенный, интерферон, клиническая-эффективность препарата Полудан уменьшается.

Совместим с антибиотиками и лекарственными средствами для лечения вирусных инфекций.

Особые указания и меры предосторожности:

Побочные явления носят транзиторный характер и исчезают после отмены препарата через 1-3 суток.

Условия хранения:

При температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Poludan_kapli