

[Полыни горькой трава](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Полыни горькой трава](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Содержит горечь (абсинтин), эфирные масла (туйон, туйол, фелландрен), дубильные вещества.

Обладает желчегонным действием и стимулирует продукцию соляной кислоты в желудке. Повышает аппетит.

Показания к применению:

Для повышения аппетита и улучшения функции органов ЖКТ:

- гипо- и анацидный гастрит;
- хронический холецистит;
- дискинезия желчевыводящих путей.

Относится к болезням:

- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;

Полыни горькой трава

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- повышенная желудочная секреция;
- гиперацидный гастрит;
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
- рефлюкс-эзофагит;
- острый холецистит;
- период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, 3 раза/сут, за 15-20 мин до еды. Курс лечения - 20-25 дней.

Настойка - по 15-20 кап, настой - по 30-45 мл.

Побочное действие:

Аллергические реакции; изжога, гастралгия, диарея, тошнота, рвота (при длительном применении).

Передозировка:

Симптомы: тремор, головная боль, головокружение, судороги.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в период лактации.

Источник: http://drugs.thead.ru/Polyni_gorkoy_trava