

## [Полыни горькой трава \(порошок\)](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Полыни горькой трава](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Препарат растительного происхождения. Содержит горечь (абсинтин), эфирные масла (туйон, туйол, фелландрен), дубильные вещества.

Обладает желчегонным действием и стимулирует продукцию соляной кислоты в желудке. Повышает аппетит.

### **Показания к применению:**

Для повышения аппетита и улучшения функции органов ЖКТ:

- гипо- и анацидный гастрит;
- хронический холецистит;
- дискинезия желчевыводящих путей.

### **Относится к болезням:**

- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

### **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;

## **Полыни горькой трава (порошок)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- повышенная желудочная секреция;
- гиперацидный гастрит;
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
- рефлюкс-эзофагит;
- острый холецистит;
- период лактации.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь, 3 раза/сут, за 15-20 мин до еды. Курс лечения - 20-25 дней.

Настойка - по 15-20 кап, настой - по 30-45 мл.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции; изжога, гастралгия, диарея, тошнота, рвота (при длительном применении).

### **Передозировка:**

*Симптомы:* тремор, головная боль, головокружение, судороги.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан в период лактации.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Polyni\\_gorkoy\\_trava\\_poroshok](http://drugs.thead.ru/Polyni_gorkoy_trava_poroshok)