

Популюс композитум СР



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Капли для приема внутрь гомеопатические** от желто-коричневого до темно-коричневого цвета, прозрачные, со слабым пряно-ароматным запахом, с преобладанием запаха этанола.

	100 г
Populus tremuloides (популюс тремулоидес) Ø	10 г
Sabal serrulatum (Serenoa repens) (сабаль серрулатум (сереноа репенс)) Ø	10 г
Capsicum annuum (Capsicum) (капсикум аннум (капсикум)) D3	3 г
Barosma betulina (Bucco) (баросма бетулина (букко)) D3	3 г
Orthosiphon aristatus (ортосифон аристатус) D3	3 г
Piper cubeba (пипер кубеба) D3	3 г
Camphora (камфора) D3	3 г
Apis mellifica (Apis) (апис меллифика (апис)) D3	3 г
Solidago virgaurea (солидаго виргауреа) D3	3 г
Scrophularia nodosa (скрофулярия нодоза) D3	3 г
Ononis spinosa (ононис спиноза) D3	3 г
Petroselinum crispum (Petroselinum) (петроселинум криспум (петроселинум)) D3	3 г
Cucurbita pepo (кикурбита пепо) D3	3 г
Baptisia tinctoria (баптизия тинктория) D3	3 г
Arctostaphylos uva-ursi (Uva ursi) (арктостафилос ува-урси (ува урси)) D3	3 г
Urginea maritima (Scilla) (ургинейя маритима (скилла)) D3	3 г
Equisetum hyemale (экуизетум хиемале) D3	3 г
Urtica urens (уртика уренс) D3	3 г
Kreosotum (креозотум) D5	3 г
Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вулгарис (берберис)) D5	3 г
Lytta vesicatoria (Cantharis) (литта весикатория (кантарис)) D5	3 г

Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus) (гидраргирум бихлоратум (меркуриус сублиматус корросивус)) D8	3 г
Terebinthina laricina (Resina Laricis) (теребинтина ларицина (ресина ларицис)) D6	3 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 80 об.%).

30 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

В комплексной терапии:

- заболеваний мочевыводящей системы;
- доброкачественной гиперплазии предстательной железы (в т.ч. аденоме предстательной железы 1 стадии).

Относится к болезням:

- [Аденома предстательной железы](#)
- [Гиперплазия предстательной железы](#)

Противопоказания:

- возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждый час. Средний курс лечения составляет 1-3 месяца. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

В составе препарата содержится около 80% (объемных) этилового спирта. Суточная доза препарата содержит около 0,24 г этилового спирта. Беречь от перегрева!

Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

При нарушениях функции печени

С осторожностью при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Populyus_kompozitum_SR