Постеризан



Код АТХ:

- C05AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для ректального и наружного применения*** белого с желтоватым оттенком цвета, с характерным запахом фенола.

	1 г
инактивированные микробные клетки E. coli	330 млн.

Вспомогательные вещества: ланолин, вазелин, фенол (консервант).

25 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

◊ ***Суппозитории ректальные*** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с характерным запахом фенола.

	1 супп.
инактивированные микробные клетки E. coli	660 млн.

Вспомогательные вещества: твердый жир, макроголглицерола гидроксистеарат, фенол (консервант).

5 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для местного применения при заболеваниях аноректальной области

Содержащиеся в Постеризане антигены клеточных стенок и метаболиты кишечной палочки при контакте со слизистой оболочкой прямой кишки и кожей аногенитальной области повышают местную резистентность тканей к воздействию патогенной микрофлоры.

Препарат стимулирует Т-лимфоцитарную систему иммунитета, в месте воздействия увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, неспецифических факторов иммунитета, уменьшает экссудацию сосудов при воспалении, нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулирует регенерацию поврежденных тканей.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

Мазь назначают взрослым при следующих заболеваниях:

— анальный зуд;

— выделения и жжение в анальной области вследствие геморроидальных заболеваний;

— анальные трещины;

— экземы.

Суппозитории назначают взрослым при следующих заболеваниях:

— анальный зуд;

— выделения и жжение в анальной области вследствие геморроидальных заболеваний.

Относится к болезням:

- Анальные трещины
- Геморрой
- Зуд
- Экзема

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к фенолу.

Способ применения и дозы:

Мазь следует наносить тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждого акта дефекации. Для более глубокого введения мази в анальное отверстие можно использовать навинчивающийся аппликатор, прилагаемый к комплекту.

Суппозитории применяют по 1 шт. утром и вечером, а также после каждого акта дефекации.

Возможно комбинированное использование мази и суппозиториев.

Продолжительность курса лечения составляет 2-3 недели.

Побочное действие:

Постеризан не обладает побочными явлениями даже при длительном применении. В качестве консерванта в препарате используется фенол, поэтому возможны аллергические реакции у пациентов с повышенной чувствительностью к этому компоненту. При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Постеризан не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение Постеризана при беременности по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Постеризан не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

В качестве консерванта в препарате используется фенол.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C; не замораживать.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Posterizan