

Постеризан форте (свечи)



Код АТХ:

- [C05AX03](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

♦ **Мазь для ректального и наружного применения** от желтоватого до светло-коричневого цвета, однородная, с характерным запахом фенола.

	1 г
инактивированные микробные клетки E. coli	500 млн.
гидрокортизон	2.5 мг

Вспомогательные вещества: ланолин, вазелин, фенол (консервант).

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

♦ **Суппозитории ректальные** от белого до желтоватого цвета, торпедовидные, с характерным запахом фенола.

	1 супп.
инактивированные микробные клетки E. coli	1000 млн.
гидрокортизон	5 мг

Вспомогательные вещества: ацетилцистеин, α-токоферол, динатрия эдетат, макроглицерола гидроксистеарат, жир твердый, фенол (консервант).

5 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, иммуностимулирующее, противоаллергическое, противозудное, регенерирующее.

Формирует специфический и стимулирует неспецифический иммунитет..

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, в составе которого два активных компонента — суспензия культуры бактерий, содержащая инактивированные бактерии и продукты их метаболизма, и гидрокортизон. Стимулирует Т-систему иммунитета, увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, повышает роль ряда гуморальных факторов неспецифического иммунитета (индуцирует образование цитокинов), усиливает образование антител в месте воздействия. Концентрированные липополисахариды клеточных оболочек и метаболиты кишечных палочек различных штаммов, в т.ч. устойчивых к действию антибиотиков и др. антибактериальных средств, приводят к росту местной резистентности тканей к воздействию патогенной микрофлоры. Гидрокортизон (содержащийся в небольшой дозе) дополняет эффект суспензии культуры бактерий благодаря противовоспалительному, противоаллергическому и противозудному действию, что проявляется в уменьшении экссудации, нормализации проницаемости и тонуса кровеносных сосудов, уменьшении отека, гиперемии, зуда, стимуляции регенерации поврежденных тканей.

Показания к применению:

Мазь назначают **взрослым** при следующих заболеваниях:

- упорное течение геморроя;
- перианальный дерматит;
- анальный зуд, особенно устойчивый к другим лекарственным средствам;
- анопиллит;
- анальная трещина.

Суппозитории назначают **взрослым** при следующих заболеваниях:

- упорное течение геморроя;
- анальный зуд, особенно устойчивый к другим лекарственным средствам;
- анопиллит;
- анальная трещина.

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)

Противопоказания:

- бактериальные инфекции в области лечения (например, туберкулез, сифилис, гонорея);
- грибковые инфекции в области лечения;
- повышенная чувствительность к гидрокортизону или другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждого акта дефекации. Для более глубокого введения мази в анальный канал можно использовать навинчивающийся аппликатор, прилагаемый к комплекту.

Суппозитории ректальные применяют утром и вечером, а также после каждого акта дефекации.

Возможно комбинированное использование мази и суппозиториев. Курс лечения продолжается 2-3 недели.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции у пациентов с повышенной чувствительностью к фенолу.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Постеризан форте не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных о том, что при применении препарата Постеризан форте гидрокортизон проникает через плацентарный барьер или выделяется с грудным молоком. До настоящего времени не обнаружено никаких сведений, указывающих на повреждающее действие препарата на плод.

Вместе с тем, препарат Постеризан форте, как и все лекарственные препараты, должен применяться при беременности и в период лактации только по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с другими препаратами, содержащими ГКС (таблетки, капли или растворы для инъекций) могут взаимно усилиться действия или побочные действия.

Особые указания и меры предосторожности:

В качестве консерванта в препарате используется фенол.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°С. Срок годности мази - 3 года, суппозиториев - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Posterizan_Forte_svechi