

## Постеризан форте



### Код АТХ:

- [C05AX03](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для ректального и наружного применения** от желтоватого до светло-коричневого цвета, однородная, с характерным запахом фенола.

	<b>1 г</b>
инактивированные микробные клетки <i>E. coli</i>	500 млн.
Гидрокортизон	2.5 мг

*Вспомогательные вещества:* ланолин, вазелин, фенол (консервант).

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

◇ **Суппозитории ректальные** от белого до желтоватого цвета, торпедовидные, с характерным запахом фенола.

	<b>1 супп.</b>
инактивированные микробные клетки <i>E. coli</i>	1000 млн.
Гидрокортизон	5 мг

*Вспомогательные вещества:* ацетилцистеин, α-токоферол, динатрия эдетат, макроголглицерола гидроксистеарат, жир твердый, фенол (консервант).

5 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммунотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

## Фармакодинамика

Препарат с противовоспалительным и иммуностимулирующим действием для местного применения.

Антигены клеточных стенок и продукты метаболизма кишечной палочки при контакте со слизистой прямой кишки и кожей аногенитальной области повышают местную резистентность тканей к воздействию патогенной микрофлоры. Препарат стимулирует Т-систему иммунитета, фагоцитарную активность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, неспецифические факторы иммунитета, уменьшает экссудацию при воспалении, нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулирует регенерацию поврежденных тканей.

Гидрокортизон при местном применении обладает противовоспалительным и противоаллергическим действием. При нанесении на пораженную поверхность уменьшает отек, гиперемию, зуд.

## Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

## Показания к применению:

Мазь назначают **взрослым** при следующих заболеваниях:

- упорное течение геморроя;
- перианальный дерматит;
- анальный зуд, особенно устойчивый к другим лекарственным средствам;
- анопиллит;
- анальная трещина.

Суппозитории назначают **взрослым** при следующих заболеваниях:

- упорное течение геморроя;
- анальный зуд, особенно устойчивый к другим лекарственным средствам;
- анопиллит;
- анальная трещина.

## Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)

## Противопоказания:

- бактериальные инфекции в области лечения (например, туберкулез, сифилис, гонорея);
- грибковые инфекции в области лечения;
- повышенная чувствительность к гидрокортизону или другим компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждого акта дефекации. Для более глубокого введения мази в анальный канал можно использовать навинчивающийся аппликатор, прилагаемый к комплекту.

Суппозитории ректальные применяют утром и вечером, а также после каждого акта дефекации.

Возможно комбинированное использование мази и суппозиториев. Курс лечения продолжается 2-3 недели.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции у пациентов с повышенной чувствительностью к фенолу.

## **Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Постеризан форте не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Нет данных о том, что при применении препарата Постеризан форте гидрокортизон проникает через плацентарный барьер или выделяется с грудным молоком. До настоящего времени не обнаружено никаких сведений, указывающих на повреждающее действие препарата на плод.

Вместе с тем, препарат Постеризан форте, как и все лекарственные препараты, должен применяться при беременности и в период лактации только по назначению врача.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении с другими препаратами, содержащими ГКС (таблетки, капли или растворы для инъекций) могут взаимно усилиться действия или побочные действия.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В качестве консерванта в препарате используется фенол.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°С. Срок годности мази - 3 года, суппозиторийев - 2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Posterizan\\_forte](http://drugs.thead.ru/Posterizan_forte)