

Постеризан (свечи)



Код АТХ:

- [C05AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для ректального и наружного применения** белого с желтоватым оттенком цвета, с характерным запахом фенола.

	1 г
инактивированные микробные клетки <i>E. coli</i>	330 млн.

Вспомогательные вещества: ланолин, вазелин, фенол (консервант).

25 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

◇ **Суппозитории ректальные** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с характерным запахом фенола.

	1 супп.
инактивированные микробные клетки <i>E. coli</i>	660 млн.

Вспомогательные вещества: твердый жир, макроглицерола гидроксистеарат, фенол (консервант).

5 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммунотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Постеризан (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат для местного применения при заболеваниях аноректальной области

Содержащиеся в Постеризане антигены клеточных стенок и метаболиты кишечной палочки при контакте со слизистой оболочкой прямой кишки и кожей аногенитальной области повышают местную резистентность тканей к воздействию патогенной микрофлоры.

Препарат стимулирует Т-лимфоцитарную систему иммунитета, в месте воздействия увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, неспецифических факторов иммунитета, уменьшает экссудацию сосудов при воспалении, нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулирует регенерацию поврежденных тканей.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

Мазь назначают взрослым при следующих заболеваниях:

- анальный зуд;
- выделения и жжение в анальной области вследствие геморроидальных заболеваний;
- анальные трещины;
- экземы.

Суппозитории назначают взрослым при следующих заболеваниях:

- анальный зуд;
- выделения и жжение в анальной области вследствие геморроидальных заболеваний.

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Зуд](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к фенолу.

Способ применения и дозы:

Мазь следует наносить тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждого акта дефекации. Для более глубокого введения мази в анальное отверстие можно использовать навинчивающийся аппликатор, прилагаемый к комплекту.

Суппозитории применяют по 1 шт. утром и вечером, а также после каждого акта дефекации.

Возможно комбинированное использование мази и суппозиториев.

Продолжительность курса лечения составляет 2-3 недели.

Побочное действие:

Постеризан не обладает побочными явлениями даже при длительном применении. В качестве консерванта в препарате используется фенол, поэтому возможны аллергические реакции у пациентов с повышенной чувствительностью к этому компоненту. При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Постеризан не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение Постеризана при беременности по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Постеризан не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

В качестве консерванта в препарате используется фенол.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C; не замораживать.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Posterizan_svechi