

Повидон



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Повидон](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Порошок для приготовления раствора для приема внутрь** белый или со слегка желтоватым оттенком порошок со слабым специфическим запахом; гигроскопичен; раствор, приготовленный в соответствии с инструкцией для медицинского применения, представляет собой прозрачную или слабо- опалесцирующую бесцветную или слегка желтоватую жидкость.

	1 пак.
повидон	2.5 г

2.5 г - пакетики (2) - пачки картонные.
2.5 г - пакетики (6) - пачки картонные.
2.5 г - пакетики (10) - пачки картонные.
2.5 г - пакетики (20) - пачки картонные.
2.5 г - пакетики (40) - пачки картонные.
2.5 г - пакетики (60) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для дезинтоксикации. Низкомолекулярный повидон (поливинилпирролидон) представляет собой полимер с молекулярной массой 12 600±2700 или 8000±2000.

Дезинтоксикационное действие обусловлено способностью связывать токсины и быстро выводить их из организма. Повидон усиливает почечный кровоток, повышает клубочковую фильтрацию, увеличивает диурез. Уменьшение молекулярного веса полимера способствует усилению дезинтоксикационного действия.

Показания к применению:

Состояния, сопровождающиеся интоксикацией, в т.ч. ожоговая болезнь в фазе интоксикации, токсические формы острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний, лучевая болезнь в фазе интоксикации, послеоперационная интоксикация, токсикоз беременных, гемолитическая болезнь и токсемия новорожденных, сепсис.

Относится к болезням:

- [Инттоксикация](#)
- [Инфекции](#)
- [Сепсис](#)
- [Токсикоз](#)
- [Токсикоз беременных](#)

Противопоказания:

Бронхиальная астма, острый нефрит, кровоизлияние в мозг, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность, повышенная чувствительность к повидону.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости от показаний.

Побочное действие:

Возможно: снижение АД, тахикардия, затрудненное дыхание.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение при беременности по показаниям.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Атерома кожи
- Вросший ноготь
- Газовая гангрена
- Гигрома сустава

Источник: <http://drugs.thead.ru/Povidon>