


## [Предуктал](#)



### **Код АТХ:**

- [C01EB15](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Триметазидин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

Таблетки, покрытые оболочкой, в блистере 30 шт, в коробке 2 блистера.

### **Состав:**

#### **Одна таблетка содержит**

*Активное вещество:* триметазидина дигидрохлорид 20 мг

*Вспомогательные вещества:* повидон, маннитол, тальк, магния стеарат, титана диоксид (E171), крахмал кукурузный, глицерол, макрогол 6000, лак желтый алюминиевый FCF S (E110), лак кошенили алюминиевый А (E124), гипромеллоза.

### **Описание:**

Таблетки, покрытые оболочкой.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Фармакологическое действие — антиангинальное.

Предотвращает уменьшение внутриклеточной концентрации АТФ, поддерживая энергетический метаболизм клеток миокарда, подвергшихся гипоксии или ишемии, обеспечивает функционирование ионных каналов, сохраняет нормальный трансмембранный транспорт ионов калия и натрия, поддерживает внутриклеточный гомеостаз.

Сохраняет энергетический метаболизм клеток миокарда и обеспечивает их защиту при гипоксии или ишемии.

У больных со стенокардией с 15 дня лечения повышается коронарный резерв (увеличивается время до появления ишемических нарушений при физической нагрузке), сокращается частота приступов стенокардии, уменьшается потребление нитратов.

### Фармакокинетика

Хорошо всасывается из ЖКТ.  $T_{1/2}$  — от 4 ч 30 мин до 5 ч 10 мин. Выводится в основном почками.

## Показания к применению:

Стенокардия.

## Относится к болезням:

- [Стенокардия](#)

## Противопоказания:

Гиперчувствительность.

## Способ применения и дозы:

Внутрь, во время еды — по 20 мг 3 раза в сутки.

## Побочное действие:

*Редко:* желудочно-кишечные расстройства.

## Передозировка:

Терапевтический диапазон дозировки достаточно широк, поэтому превышение дозы с развитием токсических эффектов маловероятно. В ряде случаев может наблюдаться уменьшение периферического сопротивления сосудов, которое влечет за собой гиперемию кожи лица или артериальную гипотензию. Лечение – симптоматическое.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Беременным и кормящим матерям назначать Предуктал не рекомендуется из-за отсутствия данных о безопасности триметазидина.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимого взаимодействия препарата Предуктал с другими лекарственными средствами не установлено.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Триметазидин не влияет на способность к вождению автомобиля и выполнению работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.

### **Условия хранения:**

Предуктал следует хранить при температуре не выше 30 °С.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Preduktal>