Предуктал



Код АТХ:

- C01EB15

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Триметазидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой, в блистере 30 шт, в коробке 2 блистера.

Состав:

Одна таблетка содержит

Активное вещество: триметазидина дигидрохлорид 20 мг

Вспомогательные вещества: повидон, маннитол, тальк, магния стеарат, титана диоксид (E171), крахмал кукурузный, глицерол, макрогол 6000, лак желтый алюминиевый FCF S (E110), лак кошенили алюминиевый A (E124), гипромеллоза.

Описание:

Таблетки, покрытые оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие — антиангинальное.

Предотвращает уменьшение внутриклеточной концентрации АТФ, поддерживая энергетический метаболизм клеток миокарда, подвергшихся гипоксии или ишемии, обеспечивает функционирование ионных каналов, сохраняет нормальный трансмембранный транспорт ионов калия и натрия, поддерживает внутриклеточный гомеостаз.

Сохраняет энергетический метаболизм клеток миокарда и обеспечивает их защиту при гипоксии или ишемии.

У больных со стенокардией с 15 дня лечения повышается коронарный резерв (увеличивается время до появления ишемических нарушений при физической нагрузке), сокращается частота приступов стенокардии, уменьшается потребление нитратов.

Фармакокинетика

Хорошо всасывается из ЖКТ. $T_{1/2}$ — от 4 ч 30 мин до 5 ч 10 мин. Выводится в основном почками.

Показания к применению:

Стенокардия.

Относится к болезням:

- Стенокардия

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, во время еды — по 20 мг 3 раза в сутки.

Побочное действие:

Редко: желудочно-кишечные расстройства.

Передозировка:

Терапевтический диапазон дозировки достаточно широк, поэтому превышение дозы с развитием токсических эффектов маловероятно. В ряде случаев может наблюдаться уменьшение периферического сопротивления сосудов, которое влечет за собой гиперемию кожи лица или артериальную гипотензию. Лечение – симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Беременным и кормящим матерям назначать Предуктал не рекомендуется из-за отсутствия данных о безопасности триметазидина.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Предуктал с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Триметазидин не влияет на способность к вождению автомобиля и выполнению работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.

Условия хранения:

Предуктал следует хранить при температуре не выше 30 °С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Preduktal