Прегнакеа

Код АТХ:

- A11AA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Минералы
- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** твердые желатиновые, темно-коричневого цвета, размер №0; содержимое капсул - желтовато-коричневый или темно-желтый гранулированный порошок.

	1 капс.
бетакаротен	4.2 мг
колекальциферол	100 МЕ (2.5 мкг)
токоферол (в форме D-α-токоферола сукцината)	20 мг
тиамин (в форме мононитрата)	3 мг
рибофлавин	2 мг
пиридоксин (в форме гидрохлорида)	10 мг
цианокобаламин	6 мкг
фитоменадион	200 мкг
фолиевая кислота	400 мкг
ниацин	20 мг
аскорбиновая кислота	70 мг
железо (в форме фумарата)	20 мг
цинк (в форме сульфата)	15 мг
магний (в форме оксида)	150 мг
йод (в форме калия йодида)	140 мкг
медь (в форме сульфата)	1 мг

Состав оболочки капсул: желатин, вода очищенная, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид черный.

15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ 19.06.2003 г.

Фар макологическое действие препарата определяется свойствами входящих в его состав компонентов. Средство, влияющее на метаболические процессы.

Показания к применению:

Предупреждение и коррекция состояний витаминно-минеральной недостаточности:

— у женщин, планирующих беременность;

— при беременности;

— в период грудного вскармливания.

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

Способ применения и дозы:

По 1 капс./сут во время или сразу после приема пищи, запивая водой. Не разжевывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка:

Случаи передозировки не известны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется принимать одновременно другие поливитаминные комплексы во избежание передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендованную дозировку.

Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что совершенно безвредно и обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата. Возможно окрашивание стула в темный цвет, что обусловлено наличием в составе препарата железа.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности — 3 г . Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pregnakea