

[Про-Симбиофлор](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь от светло-желтого до желто-коричневого цвета с характерным запахом; возможна легкая взвесь.

	1 мл (14 капель)
автолизат из бактериальных клеток <i>Escherichia coli</i> стерильный	15-45 млн. бактерий
автолизат из бактериальных клеток <i>Enterococcus faecalis</i> стерильный	15-45 млн. бактерий

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 4.9 мг, натрия карбоната декагидрат 0.96 мг, натрия хлорид 3.8 мг, магния сульфата гептагидрат 0.779 мг, калия хлорид 0.133 мг, кальция хлорида дигидрат 0.076 мг, магния хлорида гексагидрат 0.608 мг, вода очищенная 0.98 мл.

50 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат бактериального происхождения, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры.

Лечебное действие обусловлено иммуномодулирующей и адъювантной активностью бактериального липополисахарида (автолизат штамма *E.coli* DSM 17252), воздействующего на выработку специфических и неспецифических, в том числе, местных факторов защиты. Автолизат штамма *Enterococcus faecalis* DSM 16440 способствует нормализации микробиоценоза.

Показания к применению:

— синдром раздраженного кишечника.

Относится к болезням:

- [Синдром раздраженного кишечника](#)

Противопоказания:

- острый холецистит;
- острый панкреатит;
- заворот кишок;
- кахексии;
- истощение;
- непереносимость галактозы;
- дефицит лактазы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Назначают детям с 4 лет и взрослым.

Перед применением следует интенсивно встряхнуть флакон.

Лицам старше 12 лет и взрослым в начале лечения Про-Симбиофлор рекомендуется принимать 3 раза в день по 5 капель. В течение двух недель дозу необходимо увеличить до 20 капель 3 раза в день.

Возможно применение препарата **детьми с 4 лет**, начинать прием следует с дозировки 5 капель 3 раза в день, в течение 2-х недель дозу увеличивают до 10 капель 3 раза в день и придерживаются ее в терапии 4-6 недель. Курс лечения препаратом до 8 недель (в зависимости от патологического состояния). Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача. Применение препарата у детей проводят под контролем врача.

Побочное действие:

В редких случаях возможны метеоризм, вздутие живота и боль в эпигастральной области, а также крапивница и аллергические реакции.

Передозировка:

Случаев передозировки при применении препарата не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение препарата не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

Указание для людей, соблюдающих натриевую диету: 10 капель препарата содержат 0.05 моль (1.12 мг) натрия.

Не замораживать! Хорошо взболтать перед применением! Плотно закрывать флакон каждый раз после использования!

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Про-Симбиофлор

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 4 лет.

Условия хранения:

До первого вскрытия хранить в защищенном от света месте, при температуре от 2° до 27°С. После вскрытия флакона хранить в течение 3 недель при температуре от 2 до 8°С! Хранить в недоступном для детей месте! Срок годности - 2 года, после вскрытия флакона - 3 недели.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pro-Simbioflor>