

Пробифор



Код АТХ:

- [A07FA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бифидобактерии бифидум](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, корпус - белого цвета, крышечка - желтого цвета; содержимое капсул - порошок от светло-серого до темно-серого цвета с черными частицами угля и возможными вкраплениями бежевого цвета, со слабым кисломолочным запахом.

	1 капс.
Bifidobacterium bifidum (сорбированные на активированном угле)	не менее 500 млн. КОЕ

Вспомогательные вещества: лактоза.

- 6 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
- 6 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.
- 18 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
- 18 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.
- 30 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.

◇ **Порошок для приема внутрь** от светло-серого до темно-серого цвета с черными частицами угля и возможными вкраплениями бежевого цвета, со слабым кисломолочным запахом.

	1 пак.
Bifidobacterium bifidum (сорбированные на активированном угле)	не менее 500 млн. КОЕ

Вспомогательные вещества: лактоза.

Пакеты из многослойного металлополимерного материала (6) - пачки картонные.

Пакеты из многослойного металлополимерного материала (10) - пачки картонные.

Пакеты из многослойного металлополимерного материала (30) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат биологического происхождения, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры, пробиотик.

Противодиарейное действие препарата обусловлено высокой концентрацией сорбированных на частицах активированного угля бифидобактерий, являющихся антагонистами широкого спектра патогенных (в т.ч. *Shigella* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*) и условно патогенных микроорганизмов (в т.ч. *Proteus* spp., *Klebsiella* spp.).

Противоинфекционное действие препарата усилено за счет сорбции бифидобактерий на частицах угля, что приводит к ускоренной нормализации микробиоценоза ЖКТ, активизации восстановительных процессов в слизистых оболочках и повышению противоинфекционной резистентности организма.

Антитоксическое действие препарата обеспечивается быстрым заселением кишечника микроколониями бифидобактерий, восстановлением нормальной микрофлоры, которая препятствует проникновению токсинов во внутреннюю среду организма и, являясь естественным биосорбентом, аккумулирует в значительном количестве попадающие извне или образующиеся в организме токсические вещества.

Бифидобактерии в высокой концентрации активизируют пристеночное пищеварение кишечника, синтез витаминов и аминокислот, усиливают защитную функцию кишечника и иммунную защиту организма.

Показания к применению:

— острые и хронические кишечные инфекции бактериальной и вирусной природы (сальмонеллезы, шигеллезы, энтероколиты, вызванные патогенными представителями рода энтеробактерий или стафилококками, ротавирусная инфекция) или неустановленной этиологии, пищевые токсикоинфекции;

— синдром диареи различной этиологии;

— хронические неспецифические воспалительные заболевания пищеварительного тракта, сопровождающиеся нарушением микрофлоры и угнетением репаративных процессов слизистой оболочки кишечника (гастродуоденит, панкреатит, проктосигмоидит, колит /в т.ч. язвенный/);

— дисбактериозы различной этиологии, в т.ч. развившиеся на фоне и после приема антибиотиков, цитостатической, лучевой терапии; осложняющие течение вирусных гепатитов, цирроза печени, дивертикулеза кишечника различной локализации;

— синдром раздраженного кишечника, другие функциональные кишечные нарушения; синдром нарушенного кишечного всасывания различной этиологии;

— новорожденным (в т.ч. недоношенным) детям с отягощенным преморбидным фоном, начиная с периода пребывания в родильном доме, для улучшения течения периода адаптации, а также при выраженных дисбактериозах;

— в комплексном лечении больных (в т.ч. новорожденных) с вторичными иммунодефицитными состояниями, при тяжелых инфекционно-воспалительных и гнойно-септических заболеваниях (в т.ч. сепсис, перитонит); с кожными заболеваниями (атопический дерматит, стрептодермия, экзема);

— в комплексном лечении ОРВИ и гриппа;

— в комплексном лечении хирургических больных (в т.ч. травматологического профиля) для предоперационной подготовки и профилактики послеоперационных осложнений; при постгастрорезекционных расстройствах и состояниях после холецистэктомии;

— в комплексном лечении онкологических больных при проведении химиотерапии, лучевой терапии, до и после хирургических вмешательств;

— беременным женщинам при подготовке к родам, кесареву сечению и в послеоперационном периоде.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастродуоденит](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Грипп](#)
- [Дерматит](#)
- [Диарея](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Инфекции](#)
- [Колит](#)
- [Панкреатит](#)
- [Перитонит](#)
- [Проктит](#)
- [Ротавирусная инфекция](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Сепсис](#)
- [Синдром раздраженного кишечника](#)
- [Стрептодермия](#)
- [Токсикоз](#)
- [Травмы](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Шигеллез](#)
- [Экзема](#)
- [Энтерит](#)

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы:

Пробифор принимают внутрь во время приема пищи, при необходимости - независимо от приема пищи.

Препарат в форме **капсул** назначают **взрослым и детям в возрасте 5 лет и старше**. Капсулы принимают, запивая кипяченой водой или кисломолочным продуктом.

Препарат в форме **порошка для приема внутрь** назначают **взрослым и детям всех возрастных групп**. Порошок перед употреблением смешивают с жидкой пищей, предпочтительно с кисломолочным продуктом, для новорожденных и грудных детей - с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Порошок можно смешать с 30-50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Острая кишечная инфекция, пищевая токсикоинфекция, синдром диареи

Взрослым и детям старше 7 лет назначают по 2-3 капсулы или по 2-3 пакетика 2 раза/сут. Курс лечения - 3-5 дней.

Детям в возрасте от 5 до 7 лет назначают по 1 капсуле 3-4 раза/сут (возможно с коротким интервалом в 2-3 часа). Курс лечения - 2-3 дня, при сохранении клинических симптомов курс лечения увеличивают до 4-5 дней.

Детям старше 6 месяцев - по 1 пакетик 3-4 раза/сут (возможно с коротким интервалом в 2-3 часа), детям в **возрасте до 6 месяцев** - по 1 пакетик 2 раза/сут. Курс лечения - 2-3 дня, при сохранении клинических симптомов курс лечения увеличивают до 4-5 дней.

Взрослым для прекращения диареи в ранние сроки заболевания - по 3 капсулы или по 3 пакетика 2 раза/сут с интервалом от 30 мин до 1 ч. Дозу можно увеличить до 6 капсул или 6 пакетиков в один прием 1 раз/сут. Курс лечения - от 1 до 3 дней.

Хроническая патология ЖКТ и функциональные кишечные нарушения

Взрослым и детям старше 5 лет назначают по 3 капс. или по 3 пакетика в один прием 1 раз/сут во время вечернего приема пищи; **детям младше 5 лет** назначают по 3 пакетика 1 раз/сут во время вечернего приема пищи. **Взрослым** можно также назначать по 2 капсулы или по 2 пакетика 2 раза/сут.

Курс лечения составляет 5-15 дней.

При *тяжелом течении заболевания* дозу для **взрослых и детей старше 5 лет** можно увеличить до 6 капсул или 6 пакетиков в сут; **для детей в возрасте 1 года и старше** - до 6 пакетиков в сут. Курс лечения увеличивают до 30 дней.

Дисбактериоз различной этиологии, хронические кишечные инфекции, пациенты с иммунодефицитными состояниями, с кожными заболеваниями, а также для улучшения течения периода адаптации у новорожденных

Взрослым и детям старше 7 лет назначают по 2-3 капсулы или по 2-3 пакетика 2 раза/сут; **детям в возрасте 5-7 лет** - по 1 капс. 3 раза/сут, **в возрасте 3-7 лет** - по 1 пакетик 3 раза/сут; **доношенным новорожденным и детям в возрасте до 3 лет** - по 1 пакетик 2 раза/сут; **недоношенным новорожденным** - по 1 пакетик 1-2 раза/сут.

Курс лечения - 7-10 дней.

В составе комплексной терапии ОРВИ и гриппа

Взрослым, пациентам пожилого возраста, детям старше 5 лет назначают с 1-2 дня заболевания по 1 капсуле или 1 пакетик 3 раза/сут; **детям в возрасте до 5 лет** - по 1 пакетик 3 раза/сут. Курс лечения - 2 дня.

Хирургические больные, беременные женщины при подготовке к кесареву сечению с целью снижения послеоперационных осложнений

До операции - по 1 капсуле или 1 пакетик 3 раза/сут в течение 2-3 дней; для пациентов с дисбактериозом кишечника, получавших антибиотики и химиотерапию, предоперационный курс удлиняется до 7 дней.

Со 2-7 дня после операции - по 1 капсуле или 1 пакетик 3 раза/сут в течение 2-3 дней, по показаниям - 7-10 дней.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие препарата не установлено.

Передозировка:

Передозировка препарата Пробифор невозможна из-за отсутствия кумулятивного действия и избыточного накопления в кишечнике.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат разрешен для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается.

При приеме с антибиотиками возможно снижение терапевтической эффективности препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять препарат при лактазной недостаточности.

Применение в пожилом возрасте

Препарат назначают пациентам пожилого возраста по показаниям и в рекомендуемых дозах.

Применение в детском возрасте

Препарат назначают детям по показаниям и в рекомендуемых дозах.

Условия хранения:

Пакеты следует хранить при температуре не выше 10°C. Нижняя граница температуры не лимитируется.

Пробифор

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Транспортирование осуществляется при температуре не выше 10°C; допускается транспортирование при температуре до 20°C не более 10 сут. Капсулы следует хранить при температуре от 2° до 10°C. Срок годности - 1 год.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Probifor>