

## Профеталь



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Лиофилизат для приготовления раствора для в/в и в/м введения** в виде порошка или пористой массы от белого до серовато-белого цвета, гигроскопичен.

	<b>1 амп.</b>
$\alpha$ -фетопротейн	75 мкг

*Вспомогательные вещества:* декстран (стабилизатор белка  $\alpha$ -фетопротейна).

Ампулы стеклянные (5) - пачки картонные.  
Ампулы стеклянные (10) - пачки картонные.

**Лиофилизат для приготовления раствора для в/в и в/м введения** в виде порошка или пористой массы от белого до серовато-белого цвета, гигроскопичен.

	<b>1 фл.</b>
$\alpha$ -фетопротейн	75 мкг

*Вспомогательные вещества:* декстран (стабилизатор белка  $\alpha$ -фетопротейна).

Флаконы стеклянные (5) - пачки картонные.  
Флаконы стеклянные (10) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат природного происхождения с широким спектром регуляторного действия. Свойства  $\alpha$ -фетопротейна (активного вещества препарата) обусловлены его сродством к некоторым ключевым регуляторным молекулам в организме (в т.ч. стероидные гормоны, простагландины, полиненасыщенные жирные кислоты, белки экстрацеллюлярного матрикса).  $\alpha$ -фетопротейн обладает антиэстрогенными и иммуносупрессорными свойствами. В качестве транспортного белка переносит билирубин, жирные кислоты, различные лекарственные препараты.

При применении в составе комплексной терапии неспецифического язвенного колита Профеталь способствует уменьшению воспалительно-пролиферативных процессов в слизистой оболочке кишечника, позволяет снизить дозы ГКС.

При применении в составе комплексной терапии аутоиммунного тиреоидита (болезни Хашимото) препарат способствует снижению уровня антител против тиреоглобулина, восстанавливает исходно сниженный уровень Т-клеток (CD3+), увеличивает содержание CD8+ Т-лимфоцитов, повышает исходно сниженный уровень IgA и IgM, увеличивает продукцию эндогенного тироксина и трийодтиронина.

При применении в составе комплексной терапии хронических окклюзионных заболеваний сосудов  $\alpha$ -фетопротейн способствует улучшению внутрисосудистой и тканевой гемоперфузии и стимуляции заживления трофических язв.

## Профеталь

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Применение препарата при эндопротезировании снижает количество осложнений в послеоперационном периоде. Эффективность препарата обусловлена тем, что  $\alpha$ -фетопротеин является индуктором эндогенных простагландинов  $E_1$  и  $E_2$ , снимающих спазмы сосудов и блокирующих развитие аутоиммунных реакций.

### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Профеталь не предоставлены.

### Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- неспецифический язвенный колит;
- аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото);
- хронические окклюзионные заболевания сосудов (тромбангииты, облитерирующие эндартерииты, атеросклероз, инфекционно-аллергические артерииты).

### Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Инфекции](#)
- [Колит](#)
- [Окклюзия](#)
- [Тромбоз](#)

### Противопоказания:

- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам крови.

### Способ применения и дозы:

Препарат применяют в/м или в/в. Непосредственно перед применением содержимое ампулы или флакона растворяют в 0.9% растворе натрия хлорида для инъекций (5 мл - при в/м, 20 мл - при в/в струйном введении, 200 мл - при в/в капельном введении). Раствор препарата должен быть прозрачным, бесцветным. Разведенный препарат хранению не подлежит.

В/в струйно препарат рекомендуют вводить со скоростью 5 мл/мин, в/в капельно - 60-100 капель/мин.

При лечении *неспецифического язвенного колита* препарат вводят в/м или в/в (струйно или капельно) в дозе из расчета 4 мкг/кг массы тела 1 раз/сут в течение 30 дней.

При *аутоиммунном тиреоидите* Профеталь вводят в/м или в/в струйно в дозе из расчета от 1 до 4 мкг/кг 1 раз/сут в течение 30 дней.

При *окклюзионных заболеваниях сосудов* препарат вводят в/м или в/в (струйно или капельно) в дозе из расчета 2 мкг/кг 1 раз/сут в течение 14-30 дней.

Повторные курсы терапии проводят по показаниям с интервалом не менее 30 дней после завершения предыдущего курса.

### Побочное действие:

При применении по показаниям и в рекомендуемых дозах реакции на введение препарата не отмечались.

### Передозировка:

## **Профеталь**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Данные по передозировке препарата Профеталь не предоставлены.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные по лекарственному взаимодействию препарата Профеталь не предоставлены.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Рекламации на качество препарата и упаковки следует отправлять в адрес фирмы-производителя.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить и транспортировать в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2° до 8°С.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Profetal>