

[Прокаин Пенициллин G 3 Мега](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Порошок для приготовления суспензии для в/м введения	1 фл.
пенициллин G прокаин	3 млн. ЕД

Флаконы объемом 15 мл (1) - пачки картонные.
Флаконы объемом 15 мл (10) - коробки картонные.
Флаконы объемом 15 мл (50) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибиотик группы пеницилинов. Активен в отношении грамположительных бактерий, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Spirochaetaceae*, некоторых штаммов *Actinomyces spp.*

Неактивен в отношении штаммов микроорганизмов, продуцирующих пенициллиназу. Медленно всасывается и оказывает пролонгированное действие при в/м введении.

Показания к применению:

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания легкой и средней тяжести, вызванные чувствительными микроорганизмами, в т.ч. заболевания ЛОР-органов, дыхательных путей, стоматологические инфекционные заболевания, скарлатина, гонорея, все формы сифилиса.

Относится к болезням:

- [Гонорея](#)
- [Инфекции](#)
- [Сифилис](#)

- [Скарлатина](#)
- [Стоматит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к пенициллинам, прокаину.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 14 лет - 0.4-0.6 млн.ЕД/сут. Возможно повышение дозы до 1 млн.ЕД. Кратность введения 1-2 раза/сут.

Для детей в возрасте до 1 года доза составляет 0.05 млн.ЕД/кг/сут, что соответствует приблизительно 0.15-0.25 млн.ЕД/сут; детям дошкольного возраста 0.25-0.5 млн.ЕД/сут, школьного возраста - 0.5-0.75 млн.ЕД/сут; кратность введения - 1-3 раза в сут.

При острой неосложненной гонорее возможно однократное в/м введение 4.8 млн.ЕД в комбинации с 1 г пробенецида.

Вводят глубоко в/м.

При почечной недостаточности тяжелой степени интервал между повторными инъекциями составляет 2-6 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, кожный зуд, ангионевротический отек, лекарственная лихорадка; в отдельных случаях у предрасположенных пациентов - анафилактический шок, токсический эпидермальный некролиз.

Местные реакции: болезненность и уплотнение в месте инъекции. При длительном применении возможно развитие суперинфекции или реинфекции.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Источник: http://drugs.thead.ru/Prokain_Penicillin_G_3_Mega