

## Проксодолол



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Капли глазные 1%** в виде прозрачной, слегка окрашенной жидкости.

	<b>1 мл</b>
проксодолол (бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол)	10 мг

*Вспомогательные вещества:* бензетония хлорид, натрия хлорид, лимонная кислота, натрия цитрат д/и, вода д/и.

5 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.  
5 мл - флакон-капельницы полимерные (50) - пачки картонные.  
10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.  
10 мл - флакон-капельницы полимерные (50) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противоуглаукомный препарат. Неселективный бета-адреноблокатор с альфа-адреноблокирующей активностью. Влияет на  $\beta_1$  -,  $\beta_2$  - и  $\alpha$ -адренорецепторы.

Снижает внутриглазное давление, что обусловлено уменьшением продукции водянистой влаги.

Препарат не изменяет диаметр зрачка и аккомодацию глаза, не оказывает местнораздражающего действия.

Гипотензивное действие препарата в отношении внутриглазного давления наступает через 15-30 мин после инстилляций, достигает максимума через 4-6 ч.

#### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Проксодолол-АКОС не предоставлены.

### **Показания к применению:**

—повышенное внутриглазное давление;

---

- открытоугольная глаукома;
- афакическая глаукома и другие виды вторичной глаукомы;
- в качестве дополнительного средства для снижения внутриглазного давления при закрытоугольной глаукоме (в комбинации с миотиками);
- врожденная глаукома (при недостаточности прочих терапевтических мер).

**Относится к болезням:**

- [Глаукома](#)

**Противопоказания:**

- бронхиальная астма, хронические обструктивные заболевания легких;
- хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
- синусовая брадикардия;
- AV блокада II или III степени;
- артериальная гипотензия;
- кардиогенный шок;
- инсулинзависимый сахарный диабет (тип I);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Препарат следует закапывать в конъюнктивальный мешок пораженного глаза по 1 капле 2-3 раза/сут.

**Побочное действие:**

*Со стороны органа зрения:* нечеткость зрения.

*Аллергические реакции:* местная или генерализованная экзантема, крапивница.

*Со стороны ЦНС:* головокружение, головная боль, слабость.

*Со стороны пищеварительной системы:* сухость во рту, тошнота, гастралгия.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* брадикардия, AV блокада, снижение АД.

*Прочие:* повышение сократимости миомерия, развитие бронхоспазма.

**Передозировка:**

В настоящее время данные по передозировке препарата отсутствуют.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Достаточного опыта применения Проксодолола-АКОС при беременности и в период лактации нет.

Применение препарата возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или младенца.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Проксодолол-АКОС при совместном применении потенцирует действие пилокарпина, клонидина.

При одновременном применении Проксодолола-АКОС с альфа- и бета-адреноблокаторами для приема внутрь наблюдается взаимное усиление их действия.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В период применения Проксодолола-АКОС не рекомендуется ношение мягких контактных линз.

При использовании жестких линз следует снять их перед закапыванием и вновь надеть через 15-20 мин после инстилляциии препарата.

### *Использование в педиатрии*

Достаточного опыта применения препарата у детей нет. Применение Проксодолола-АКОС возможно только в том случае, если предполагаемая польза превышает риск развития побочных реакций.

### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

После закапывания препарата у некоторых пациентов может наблюдаться нечеткость зрения, поэтому в течение некоторого времени после инстилляциии не следует заниматься деятельностью, требующей четкости зрения и быстроты психомоторных реакций.

### **Применение в детском возрасте**

Достаточного опыта применения препарата у детей нет. Применение Проксодолола-АКОС возможно только в том случае, если предполагаемая польза превышает риск развития побочных реакций.

## **Условия хранения:**

Список Б. Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте.

### *Условия отпуска из аптек*

Препарат отпускают по рецепту.

## **Срок годности:**

2 года.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Proksodolol>