Проксофелин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Клонидин
- Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные в виде прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости.

	1 мл
клонидин	2.5 мг
проксодолол	10 мг

Вспомогательные вещества: бензетония хлорид, натрия хлорид, лимонная кислота, натрия цитрата пентасесквигидрат, вода д/и.

1.3 мл - тюбик-капельницы (5) полимерные - пачки картонные.
1.5 мл - тюбик-капельницы (5) полимерные - пачки картонные.
2 мл - тюбик-капельницы (5) полимерные - пачки картонные.
5 мл - тюбик-капельницы (5) полимерные - пачки картонные.
5 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.
10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный противоглаукомный препарат. Клофелин и проксодолол снижают внутриглазное давление за счет уменьшения продукции водянистой влаги и увеличения ее оттока.

Эффект наступает через 15-30 мин после инстилляции, достигает максимума через 2-6 ч и сохраняется 24 ч.

Не оказывает влияния на аккомодацию, рефракцию и величину зрачка.

Показания к применению:

Различные формы глаукомы:

— открытоугольная;

— закрытоугольная (в комбинации с миотиками);

— вторичная (в случае недостаточного эффекта монотерапии проксодололом или клонидином).

Относится к болезням:

- Глаукома

Противопоказания:

— бронхиальная астма;

— хроническая обструктивная болезнь легких;

— хроническая сердечная недостаточность;

— брадикардия;

— AV-блокада II-III степени;

— артериальная гипотензия;

— беременность;

— детский возраст (достаточного опыта применения препарата у детей нет);

— индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует принимать препарат при сахарном диабете 1 типа, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы:

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок глаза по 1 капле 2 раза/сут. Возможно сочетание с пилокарпином, который закапывают 1-3 раза/сут.

Побочное действие:

В единичных случаях: снижение АД, замедление сердечного ритма, сухость во рту, сонливость, слабость, головокружение, но в меньшей степени, чем от применения одного клонидина.

Передозировка:

Данные о случаях передозировки препарата Проксофелин не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При необходимости назначения препарата при беременности следует сопоставить пользу для матери и риск для плода.

Неизвестно, выделяются ли действующие вещества с грудным молоком, поэтому в период лактации, на время применения препарата, рекомендуется отменить грудное вскармливание.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие пилокарпина на внутриглазное давление.

При одновременном назначении системных альфа- или бета-блокаторов возможно усиление их гипотензивного действия.

Особые указания и меры предосторожности:

В период применения препарата не рекомендуется ношение мягких контактных линз. При использовании жестких линз следует снять их перед закапыванием и вновь надеть через 15-20 минут после инстилляции препарата.

Тюбик-капельницы необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком тюбик-капельницы к глазу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, у которых после инстилляции временно теряется четкость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо другим сложным оборудованием, требующим четкости зрения сразу после закапывания препарата.

Условия хранения:

Список А. Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 15°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Proksofelin