

## [Проксофелин](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Клонидин](#)
- [Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капли глазные** в виде прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости.

	<b>1 мл</b>
клонидин	2.5 мг
проксодолол	10 мг

*Вспомогательные вещества:* бензетония хлорид, натрия хлорид, лимонная кислота, натрия цитрата пентасесквигидрат, вода д/и.

1.3 мл - тьюбик-капельницы (5) полимерные - пачки картонные.  
1.5 мл - тьюбик-капельницы (5) полимерные - пачки картонные.  
2 мл - тьюбик-капельницы (5) полимерные - пачки картонные.  
5 мл - тьюбик-капельницы (5) полимерные - пачки картонные.  
5 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.  
10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный противоглаукомный препарат. Клофелин и проксодолол снижают внутриглазное давление за счет уменьшения продукции водянистой влаги и увеличения ее оттока.

Эффект наступает через 15-30 мин после инстилляций, достигает максимума через 2-6 ч и сохраняется 24 ч.

Не оказывает влияния на аккомодацию, рефракцию и величину зрачка.

### Показания к применению:

Различные формы глаукомы:

— открытоугольная;

## Проксофелин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- закрытоугольная (в комбинации с миотиками);
- вторичная (в случае недостаточного эффекта монотерапии проксодололом или клонидином).

### Относится к болезням:

- [Глаукома](#)

### Противопоказания:

- бронхиальная астма;
- хроническая обструктивная болезнь легких;
- хроническая сердечная недостаточность;
- брадикардия;
- AV-блокада II-III степени;
- артериальная гипотензия;
- беременность;
- детский возраст (достаточного опыта применения препарата у детей нет);
- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует принимать препарат при сахарном диабете 1 типа, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

### Способ применения и дозы:

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок глаза по 1 капле 2 раза/сут. Возможно сочетание с пилокарпином, который закапывают 1-3 раза/сут.

### Побочное действие:

*В единичных случаях:* снижение АД, замедление сердечного ритма, сухость во рту, сонливость, слабость, головокружение, но в меньшей степени, чем от применения одного клонидина.

### Передозировка:

Данные о случаях передозировки препарата Проксофелин не предоставлены.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

При необходимости назначения препарата при беременности следует сопоставить пользу для матери и риск для плода.

Неизвестно, выделяются ли действующие вещества с грудным молоком, поэтому в период лактации, на время применения препарата, рекомендуется отменить грудное вскармливание.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие пилокарпина на внутриглазное давление.

При одновременном назначении системных альфа- или бета-блокаторов возможно усиление их гипотензивного действия.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В период применения препарата не рекомендуется ношение мягких контактных линз. При использовании жестких линз следует снять их перед закапыванием и вновь надеть через 15-20 минут после инстилляциии препарата.

Тюбик-капельницы необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком тюбик-капельницы к глазу.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Пациентам, у которых после инстилляциии временно теряется четкость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо другим сложным оборудованием, требующим четкости зрения сразу после закапывания препарата.

## **Условия хранения:**

Список А. Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 15°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Proksofelin>