

[Проксокарпин](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли глазные в виде прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости.

	1 мл
пилокарпина гидрохлорид	10 мг
проксодолол	10 мг

Вспомогательные вещества: лимонная кислота, натрия цитрат д/и, натрия хлорид, бензетония хлорид, вода очищенная.

- 1.3 мл - тубик-капельницы (5) - пачки картонные.
- 1.3 мл - тубик-капельницы (10) - пачки картонные.
- 1.5 мл - тубик-капельницы (5) - пачки картонные.
- 1.5 мл - тубик-капельницы (10) - пачки картонные.
- 2 мл - тубик-капельницы (5) - пачки картонные.
- 2 мл - тубик-капельницы (10) - пачки картонные.
- 5 мл - тубик-капельницы (5) - пачки картонные.
- 5 мл - тубик-капельницы (10) - пачки картонные.
- 5 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
- 10 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
- 5 мл - флаконы (1) в комплекте с капельницей - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный противоглаукомный препарат.

Проксодолол - неселективный бета-адреноблокатор, который обладает также избирательным альфа-адреноблокирующим эффектом. Угнетает продукцию водянистой влаги.

Пилокарпин - м-холиномиметик, увеличивает отток внутриглазной жидкости, вследствие раскрытия угла передней камеры и деблокады шлеммова канала.

Действующие вещества обладают аддитивным эффектом.

Действие препарата начинается через 1 ч после инстилляции, достигает максимума через 4-6 ч и продолжается более 24 ч.

Препарат не оказывает повреждающего действия на ткани глаза.

Показания к применению:

- различные формы глаукомы (первичная открытоугольная, закрытоугольная, врожденная, юношеская, вторичная);
- недостаточная эффективность монотерапии проксодололом или пилокарпином.

Относится к болезням:

- [Глаукома](#)

Противопоказания:

- бронхиальная астма;
- бронхообструктивные заболевания легких;
- хроническая сердечная недостаточность;
- брадикардия;
- артериальная гипотензия;
- AV-блокада II-III степени;
- воспаление переднего отдела сосудистой оболочки глаза (радужки, цилиарного тела) - ирит, иридоциклит;
- беременность;
- индивидуальная повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует закапывать в конъюнктивальный мешок глаза по 1 капле 2 раза/сут.

Побочное действие:

Со стороны органа зрения: жжение, миоз, спазм аккомодации, слезотечение, кратковременное ухудшение зрения, обусловленное сужением зрачка, боль в глазу, аллергический конъюнктивит, дерматит кожи век.

Системные побочные эффекты: головная боль, ринорея; редко - бронхоспазм, слюнотечение, замедление ЧСС, снижение АД.

Передозировка:

Симптомы: тошнота и брадикардия.

Лечение симптоматическое. Атропин можно применять как специфический антидот. При выраженной брадикардии из-за передозировки м-холиномиметика вводят 0.5-2 мг атропина парентерально.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с недостатком опыта не рекомендуется применять препарат при беременности и в период лактации.

Применение Проксокарпина в эти периоды возможно только в тех случаях, когда ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития побочных эффектов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Проксокарпин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Антагонистами пилокарпина являются атропин и другие м-холиноблокаторы.

М-холиностимулирующая активность пилокарпина снижается при комбинации с трициклическими антидепрессантами, производными фенотиазина, хлорпротиксеном, клозапином; усиливается - при комбинации с антихолинэстеразными средствами.

Возможно развитие брадикардии и снижение АД во время общей анестезии с применением фторотана.

Особые указания и меры предосторожности:

Проксокарпин хорошо сочетается с бета-адреноблокаторами и другими препаратами для лечения глаукомы.

В случае острого приступа закрытоугольной глаукомы пилокарпин можно применять отдельно или в комбинации с ингибиторами карбоангидразы.

В период применения препарата не рекомендуется ношение мягких контактных линз. При использовании жестких линз следует их снять перед закапыванием и вновь надеть через 15-20 минут после инстилляций препарата.

Лечение следует проводить при регулярном контроле внутриглазного давления.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, у которых после закапывания теряется четкость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, требующей четкости зрения сразу после закапывания препарата.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C (во флаконах), не выше 15°C (в тубик-капельницах). Срок годности - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Proksokarpin>