Прокто-Гливенол



Код АТХ:

- C05AX03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин
- Трибенозид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем ректальный*** гомогенный, белого цвета, со слабым характерным запахом.

	100 г
трибенозид	5 г
лидокаина гидрохлорид	2.12 г

Вспомогательные вещества: цетомакрогол 1000 - 4.44 г, цетиловый спирт - 5 г, изопропилпальмитат - 2 г, парафин жидкий - 10 г, метилпарагидроксибензоат - 180 мг, пропилпарагидроксибензоат - 50 мг, сорбитана стеарат - 1.56 мг, сорбитол - 6 г, стеариновая кислота - 9 г, вода - 54.65 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с полиэтиленовым наконечником и насадкой-крышечкой из латекса - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный противогеморроидальный препарат.

Трибенозид уменьшает проницаемость капилляров и улучшает сосудистый тонус, антагонистически воздействует на некоторые эндогенные вещества, выполняющие роль медиаторов при развитии воспаления и боли.

Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие.

Препарат вызывает быстрое ослабление симптомов, вызванных геморроем (боль, зуд и натяжение кожи).

Фармакокинетика

Всасывание

После применения крема 2-20% трибенозида абсорбируется через слизистую оболочку.

Метаболизм

Трибенозид быстро метаболизируется в печени.

Показания к применению:

— наружный и внутренний геморрой.

Относится к болезням:

- Геморрой

Противопоказания:

— печеночная недостаточность;

— I триместр беременности;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают ректально утром и вечером до исчезновения выраженных клинических симптомов. При *регрессии острых симптомов* частоту применения уменьшают до 1 раза/сут.

При *внутренних геморроидальных узлах* крем вводят с помощью насадки. 30 г крема (1 туба) достаточно примерно для 20-30 применений.

Побочное действие:

Со стороны иммунной системы: очень редко (< 1/10 000) - анафилактические реакции, включая ангионевротический отек, отек лица, бронхоспазм и сердечно-сосудистые нарушения.

Со стороны кожи и подкожных тканей: редко (>1/10 000, < 1/1 000) - кожные реакции в месте применения (жжение, сыпь, зуд и крапивница). Данные симптомы могут распространяться за пределы места применения.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы.

При случайном приеме внутрь рекомендуется промывание ЖКТ, а также симптоматическая поддерживающая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности Прокто-Гливенол не назначают в I триместре. При применении препарата во II и III триместрах беременности необходимо учитывать возможный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует взвесить ожидаемую пользу терапии для матери и потенциальный риск для ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи взаимодействия не зарегистрированы.

Особые указания и меры предосторожности:

Если на фоне применения препарата состояние пациента существенно не улучшается или появляются необычные симптомы, следует верифицировать диагноз.

В период лечения пациент должен следить за гигиеной анальной области, избегать чрезмерного напряжения, принимать меры для поддержания мягкой консистенции стула.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении в дозах, не превышающих рекомендуемые, препарат не оказывает влияния на способность выполнения работы, связанной с необходимостью концентрации внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Prokto-Glivenol