

## Прокто-Гливенол



### Код АТХ:

- [C05AX03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лидокаин](#)
- [Трибенозид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Крем ректальный** гомогенный, белого цвета, со слабым характерным запахом.

	<b>100 г</b>
трибенозид	5 г
лидокаина гидрохлорид	2.12 г

*Вспомогательные вещества:* цетомакрогол 1000 - 4.44 г, цетиловый спирт - 5 г, изопропилпальмитат - 2 г, парафин жидкий - 10 г, метилпарагидроксibenзоат - 180 мг, пропилпарагидроксibenзоат - 50 мг, сорбитана стеарат - 1.56 мг, сорбитол - 6 г, стеариновая кислота - 9 г, вода - 54.65 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с полиэтиленовым наконечником и насадкой-крышечкой из латекса - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный противогеморроидальный препарат.

*Трибенозид* уменьшает проницаемость капилляров и улучшает сосудистый тонус, антагонистически воздействует на некоторые эндогенные вещества, выполняющие роль медиаторов при развитии воспаления и боли.

*Лидокаин* оказывает местноанестезирующее действие.

Препарат вызывает быстрое ослабление симптомов, вызванных геморроем (боль, зуд и натяжение кожи).

## **Фармакокинетика**

### *Всасывание*

После применения крема 2-20% трибенозида абсорбируется через слизистую оболочку.

### *Метаболизм*

Трибенозид быстро метаболизируется в печени.

## **Показания к применению:**

— наружный и внутренний геморрой.

## **Относится к болезням:**

- [Геморрой](#)

## **Противопоказания:**

- печеночная недостаточность;
- I триместр беременности;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Препарат назначают ректально утром и вечером до исчезновения выраженных клинических симптомов. При *регрессии острых симптомов* частоту применения уменьшают до 1 раза/сут.

При *внутренних геморроидальных узлах* крем вводят с помощью насадки. 30 г крема (1 туба) достаточно примерно для 20-30 применений.

## **Побочное действие:**

*Со стороны иммунной системы:* очень редко (< 1/10 000) - анафилактические реакции, включая ангионевротический отек, отек лица, бронхоспазм и сердечно-сосудистые нарушения.

*Со стороны кожи и подкожных тканей:* редко (>1/10 000, < 1/1 000) - кожные реакции в месте применения (жжение, сыпь, зуд и крапивница). Данные симптомы могут распространяться за пределы места применения.

## **Передозировка:**

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы.

При случайном приеме внутрь рекомендуется промывание ЖКТ, а также симптоматическая поддерживающая терапия.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности Прокто-Гливенол не назначают в I триместре. При применении препарата во II и III триместрах беременности необходимо учитывать возможный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует взвесить ожидаемую пользу терапии для матери и потенциальный риск для ребенка.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Случаи взаимодействия не зарегистрированы.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Если на фоне применения препарата состояние пациента существенно не улучшается или появляются необычные симптомы, следует верифицировать диагноз.

В период лечения пациент должен следить за гигиеной анальной области, избегать чрезмерного напряжения, принимать меры для поддержания мягкой консистенции стула.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

При применении в дозах, не превышающих рекомендуемые, препарат не оказывает влияния на способность выполнения работы, связанной с необходимостью концентрации внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при печеночной недостаточности.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Prokto-Glivenol>